


Arrow.



Tradycyjny
Tradycyjne

Bardzo wczesna odmiana konsumpcyjna z bardzo atrakcyjnie wyglądającą skórą. Odmianę tę można uprawiać na różnego rodzaju glebach.

- ▶ **Kremowy kolor miąższu**
- ▶ **Owalno-podłużne bulwy**
- ▶ **Dobra odporność na suszę**



Cechy charakterystyczne

Ogólne cechy charakterystyczne

Hodowca: Agrico Research B.V.
Krzyżowanie: SOLARA x FRESCO
Prawa hodowcy: 31-12-2034
Sadzonka: AR 93-0084

Cechy charakterystyczne rośliny i bulwy

Dojrzałość: bardzo wczesna / 8
Kolor kielków: - / -
Kolor kwiatów: biały / W
Liczba jagód: bardzo wysoka / 4
Liście - rozwój początkowy: średni / 6,5
Liście - rozwój końcowy: średni / 7
Liście - twardość: średnie / 6
Kolor skórki: żółty / Y
Kolor miąższu: kremowy / 5
Wygląd skórki: doskonały / 8
Kształt bulwy: owalno-podłużny / OL
Regularność kształtu bulwy: regularne / 7
Zawijanie bulw: dość niskie / 5
Wielkość bulwy: duża / 8
Regularność wielkości: dość regularne / 6,5
Okres spoczynku: dość krótki / 5

Wrażliwość i jakość

Wtórna wegetacja: dość wrażliwe / 6
Czarna plamistość (uszkodzenia wewnętrzne): nieznacznie wrażliwe / 7
Pęknięcia podczas wzrostu: dość wrażliwe / 6,5
Uszkodzenia podczas zbioru: dość wrażliwe / 6
Metrybuzyna Przedwzrostowo: wrażliwe / 5
Metrybuzyna Powszchodowo: wrażliwe / 5
Bentazon: - / -
Etylen: 15% do 25% więcej bulw / 7
Ciężar pod wodą: 355
Zawartość suchej masy: 19,5%
Typ kulinarny: raczej zwięzły / AB
Szare przebarwienia (po ugotowaniu): nieznacznie wrażliwe / 7
Przebarwienie: - / -
Odmiana frytkowa: nieodpowiednia / 4
Rozkład suchej masy: - / -
Odmiana chipsowa: nieodpowiednia / 4
Poziom TGA: 2,8



Zalecenia uprawowe

Nawożenie ¹

Azot: standardowe zalecenie + 10%. Najlepiej w formie aplikacji dzielonej, z drugą dawką tuż po wytworzeniu się bulw.

Fosfor: standardowe zalecenie.

Potas: standardowe zalecenie.

Zaprawianie nasion

Prawidłowe podkiełkowanie po oderwaniu górnego kielka może dać pozytywny wynik, jeśli chodzi o wiązanie bulw. Obrywanie kielków więcej niż jeden raz może mieć negatywny wpływ na regularność plonu i wielkość bulw.

Odległość rozsadzania

28/35 mm: 20 cm (67.000 roślin/ha)

35/55 mm: 25 cm (54.000 roślin/ha)

Chwasty

Standardowe zastosowanie metrybuzyny (Sencor) po wzejściu powoduje poważną reakcję liści i w pewnym stopniu prowadzi do zmniejszenia plonu.

Fungicydy

Niezbędny jest ścisły harmonogram oprysków prewencyjnych przeciwko zarazie ziemniaczanej.

Zbiór

Ze względu na wyniki w zakresie wrażliwości na ciemną plamistość i/lub uszkodzenia podczas zbioru, po desykacji należy poczekać co najmniej dwa tygodnie przed zbiorami.

Temperatura przechowywania - Okres przechowywania

Zalecana temperatura przechowywania wynosi 5°C. Do dostawy prosto z pola lub do przechowywania krótkoterminowego.



Say potato,
say **Agrico.**

Odporność

Wirus - Liściozwój: - / -

Wirus - Yn: podatne / 5,5

Wirus - Yntn (bulwy): nieznacznie podatne / 7,5

Nekrotyczne plamki: nieznacznie podatne / 6

Zaraza ziemniaczana - liście: bardzo podatne / 4

Zaraza ziemniaczana - bulwy: nieznacznie podatne / 7

Fusarium: podatne / 5

Parch zwykły: nieznacznie podatne / 6

Parch prószysty ziemniaka: podatne / 5

Antraknoza ziemniaka: nieznacznie podatne / 7,5

Erwinia: podatne / 5

Rak ziemniaczany F1: odporne / 10

Rak ziemniaczany F6: - / -

Rak ziemniaczany F18: - / -

Mątwik ziemniaczany Ro 1/4: odporne / 9

Mątwik ziemniaczany Ro 2/3: - / -

Mątwik agresywny Pa 2: - / -

Mątwik agresywny Pa 3: - / -