ZALECENIA DOTYCZĄCE UPRAW

Fontane.

Średnio późna odmiana przetwórcza, o wysokiej plenności, do produkcji frytek i płatków.

Przemysł
Frytki
Czipsy
Płatki

- **Duże bulwy**
- **Duża zawartość suchej masy**
- **Przeznaczone do różnego rodzaju gleby**

Cechy charakterystyczne

Ogólne cechy charakterystyczne

Hodowca: Lantmännen Seed B.V.

Krzyżowanie: AGRIA x AR 76-034-03

Prawa hodowcy: 31-12-2028

Sadzonka: SW 87-1140

Cechy charakterystyczne rośliny i bulwy

Dojrzałość: średnio późna / 5,5

Kolor kiełków: niebiesko-fioletowy / BV

Kolor kwiatów: biały / W

Liczba jagód: powyżej średniej / 5

Liście – rozwój początkowy: dość szybki / 7,5

Liście – rozwój końcowy: średni / 7

Liście – twardość: dość mocne / 7

Kolor skórki: żółty / Y

Kolor miąższu: jasnożółty / 6,5

Wygląd skórki: raczej słaby / 5

Kształt bulwy: owalny / O

Regularność kształtu bulwy: dość regularne / 6,5

Zawiązywanie bulw: dość wysokie / 7

Wielkość bulwy: dość duża / 7

Regularność wielkości: dość regularne / 6

Okres spoczynku: dość krótki / 5,5

Wrażliwość i jakość

Wtórna wegetacja: dość wrażliwe / 6

Czarna plamistość (uszkodzenia wewnętrzne): dość wrażliwe / 6

Pęknięcia podczas wzrostu: dość wrażliwe / 6

Uszkodzenia podczas zbioru: dość wrażliwe / 6

Metrybuzyna Przedwschodowo: nieznacznie wrażliwe do niewrażliwe / 8

Metrybuzyna Powschodowo: nieznacznie wrażliwe do niewrażliwe / 8

Bentazon: dość wrażliwe / 6

Etylen: 15% do 25% więcej bulw / 7

Ciężar pod woda: 430

Zawartość suchej masy: 23,2%

Typ kulinarny: mączysty / BC

Szare przebarwienia (po ugotowaniu): dość wrażliwe / 6,5

Przebarwienie: wrażliwe / 5,5

Odmiana frytkowa: bardzo dobra / 7,5

Rozkład suchej masy: średni / 6,5

Odmiana czipsowa: średnia / 6

Poziom TGA: 6,1

Firma Agrico dołożyła wszelkich starań, aby stworzyć ten opis odmiany. Należy jednak pamiętać o tym, że wszelkie informacje mogą ulec zmianie, a firma Agrico nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub pominięcia. Firma Agrico w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające lub związane z informacjami zawartymi w niniejszym opisie.

AGRICO

Zalecenia uprawowe

Nawożenie [1]

Azot: standardowe zalecenie + 30%.Można stosować nawóz organiczny.

Fosfor: standardowe zalecenie.

Potas: standardowe zalecenie + 10%.

Zaprawianie nasion

Można sadzić bezpośrednio po wyciągnięciu z chłodni, najlepiej po krótkim szoku termicznym.Obrywanie kiełków więcej niż dwa razy może mieć negatywny wpływ na regularność plonu i wielkość bulw.

Odległość rozsadzania

28/35 mm: 27 cm (50.000 roślin/ha)
35/55 mm: 33 cm (40.000 roślin/ha)
50/55 mm: 40 cm (33.000 roślin/ha)

Chwasty

Standardowe zastosowanie metrybuzyny (Sencor) po wzejściu nie powoduje reakcji liści ani nie zmniejsza plonu.

Fungicydy

Niezbędny jest ścisły harmonogram oprysków prewencyjnych przeciwko zarazie ziemniaczanej.

Zbiór

Ze względu na wyniki w zakresie wrażliwości na ciemną plamistość i/lub uszkodzenia podczas zbioru, po desykacji należy zaczekać co najmniej trzy tygodnie przed zbiorami.

Temperatura przechowywania - Okres przechowywania

Zalecana temperatura przechowywania wynosi 5ºC. Na potrzeby przetwarzania nie przechowywać w temperaturze poniżej 7ºC. Do przechowywania długoterminowego.

©Agrico 2022-04

Say potato, Say potato, say Agrico.

Odporność

Wirus – Liściozwój: nieznacznie podatne / 6

Wirus – Yn: podatne / 5,5

Wirus – Yntn (bulwy): nieznacznie podatne / 7

Nekrotyczne plamki: nieznacznie podatne / 6,5

Zaraza ziemniaczana – liście: podatne / 5

Zaraza ziemniaczana – bulwy: nieznacznie podatne / 6,5

Fusarium: nieznacznie podatne / 6

Parch zwykły: nieznacznie podatne / 6

Parch prószysty ziemniaka: nieznacznie podatne / 6

Antraknoza ziemniaka: - / -

Erwinia: nieznacznie podatne / 6

Rak ziemniaczany F1: dość podatne / 6

Rak ziemniaczany F6: umiarkowanie podatne / 8

Rak ziemniaczany F18: - / -

Mątwik ziemniaczany Ro 1/4: odporne / 9

Mątwik ziemniaczany Ro 2/3: - / -

Mątwik agresywny Pa 2: - / -

Mątwik agresywny Pa 3: - / -