

Kuras.

Odmiana późna do produkcji skrobi, odporna na mątwika i zapewniająca bardzo dobre plony skrobi.



**Przemysł
Skrobia**

- » **Biały kolor miąższu**
- » **Dobrze się przechowuje**
- » **Dobra odporność na wirusy i zarazy ziemniaczaną**



Cechy charakterystyczne

Ogólne cechy charakterystyczne

Hodowca: G. Kuper

Krzyżowanie: PG 285 x AR 69-0491

Prawa hodowcy: Wygasło

Sadzonka: KU 80-1271

Cechy charakterystyczne rośliny i bulwy

Dojrzałość: późna / 4

Kolor kielków: niebiesko-fioletowy / BV

Kolor kwiatów: biały / W

Liczba jagód: bardzo wysoka / 4

Liście - rozwój początkowy: dość szybki / 7

Liście - rozwój końcowy: dość dobry / 7,5

Liście - twardość: dość mocne / 7,5

Kolor skórki: żółty / Y

Kolor miąższu: biały / 4,5

Wygląd skórki: raczej słaby / 5

Kształt bulwy: okrągło-owalny / RO

Regularność kształtu bulwy: dość regularne / 6

Zawiązywanie bulw: średnie / 6

Wielkość bulwy: dość duża / 7,5

Regularność wielkości: regularne / 7

Okres spoczynku: dość krótki / 5,5

Wrażliwość i jakość

Wtórna wegetacja: dość wrażliwe / 6

Czarna plamistość (uszkodzenia wewnętrzne): dość wrażliwe / 6

Pęknięcia podczas wzrostu: nieznacznie wrażliwe / 7

Uszkodzenia podczas zbioru: wrażliwe / 5,5

Metrybuzyna Przedwzschodowo: nieznacznie wrażliwe / 7

Metrybuzyna Powschodowo: nieznacznie wrażliwe / 7

Bentazon: - / -

Etylen: - / -

Ciężar pod wodą: 490

Zawartość suchej masy: 25,9%

Typ kulinarny: mączysty / C

Szare przebarwienia (po ugotowaniu): bardzo wrażliwe / 4,5

Przebarwienie: - / -

Odmiana frytkowa: poniżej średniej / 5,5

Rozkład suchej masy: - / -

Odmiana chipsowa: nieodpowiednia / 4,5

Poziom TGA: 33,8



Zalecenia uprawowe

Nawożenie ¹

Azot: standardowe zalecenie + 5%.

Fosfor: standardowe zalecenie.

Potas: standardowe zalecenie + 10%.

Zaprawianie nasion

Prawidłowe podkiełkowanie po oderwaniu górnego kielka może dać pozytywny wynik, jeśli chodzi o wiązanie bulw. Obrywanie kielków więcej niż jeden raz może mieć negatywny wpływ na regularność plonu i wielkość bulw.

Odległość rozsadzania

28/35 mm: 25 cm (54.000 roślin/ha)

35/55 mm: 30 cm (45.000 roślin/ha)

Chwasty

Standardowe zastosowanie metrybuzyny (Sencor) po wzejściu może powodować pewną reakcję liści, ale rzadko prowadzi do zmniejszenia plonu.

Fungicydy

Zalecany jest harmonogram oprysków prewencyjnych przeciwko zarazie ziemniaczanej.

Zbiór

Ze względu na wyniki w zakresie wrażliwości na ciemną plamistość i/lub uszkodzenia podczas zbioru, po desykacji należy poczekać co najmniej dwa tygodnie przed zbiorami.

Temperatura przechowywania - Okres przechowywania

Zalecana temperatura przechowywania wynosi 5°C. Do średnioterminowego przechowywania.



Say potato,
say **Agrico.**

Odporność

Wirus - Liściozwój: nieznacznie podatne / 7

Wirus - Yn: nieznacznie podatne do niepodatne / 8

Wirus - Yntn (bulwy): nieznacznie podatne do niepodatne / 9

Nekrotyczne plamki: nieznacznie podatne / 6,5

Zaraza ziemniaczana - liście: nieznacznie podatne do niepodatne / 8

Zaraza ziemniaczana - bulwy: nieznacznie podatne do niepodatne / 8

Fusarium: nieznacznie podatne / 7

Parch zwykły: podatne / 5,5

Parch prószysty ziemniaka: nieznacznie podatne / 6,5

Antraknoza ziemniaka: - / -

Erwinia: podatne / 5

Rak ziemniaczany F1: odporne / 10

Rak ziemniaczany F6: dość podatne / 5

Rak ziemniaczany F18: - / -

Mątwik ziemniaczany Ro 1/4: odporne / 9

Mątwik ziemniaczany Ro 2/3: odporne / 9

Mątwik agresywny Pa 2: - / -

Mątwik agresywny Pa 3: - / -