


Armedi.

Wczesna odmiana, idealna do produkcji frytek



**Przemysł
Frytki**

- ▶ **Duża liczba bulw**
- ▶ **Nadaje się do długotrwałego przechowywania**
- ▶ **Odporność na wiele rodzajów mącznika ziemniaczanego**



Cechy charakterystyczne

Ogólne cechy charakterystyczne

Hodowca: Agrico Research B.V.
 Krzyżowanie: TOPAS x BASIN RUSSET
 Prawa hodowcy: 31-12-2051
 Sadzonka: AR 10-2432

Cechy charakterystyczne rośliny i bulwy

Dojrzałość: średnio późna / 5,5
 Kolor kielków: - / -
 Kolor kwiatów: purpurowy / P
 Liczba jagód: średnia / 6
 Liście - rozwój początkowy: dość szybki / 7
 Liście - rozwój końcowy: dobry / 8
 Liście - twardość: mocne / 8
 Kolor skórki: żółty / Y
 Kolor miąższu: jasnożółty / 6
 Wygląd skórki: średni / 6
 Kształt bulwy: owalno-podłużny / OL
 Regularność kształtu bulwy: regularne / 7
 Zawiązywanie bulw: średnie / 6,5
 Wielkość bulwy: dość duża / 7,5
 Regularność wielkości: dość regularne / 6,5
 Okres spoczynku: średni / 6,5

Wrażliwość i jakość

Wtórna wegetacja: dość wrażliwe / 6
 Czarna plamistość (uszkodzenia wewnętrzne): dość wrażliwe / 6,5
 Pęknięcia podczas wzrostu: nieznacznie wrażliwe / 7
 Uszkodzenia podczas zbioru: dość wrażliwe / 6
 Metrybuzyna Przedwschodowo: bardzo wrażliwe / 3
 Metrybuzyna Powschodowo: bardzo wrażliwe / 3
 Bentazon: - / -
 Etylen: 5% mniej do 5% więcej bulw / 5
 Ciężar pod wodą: 402
 Zawartość suchej masy: 21,8%
 Typ kulinarny: mączysty / C
 Szare przebarwienia (po ugotowaniu): nieznacznie wrażliwe / 7
 Przebarwienie: dość wrażliwe / 6,5
 Odmiana frytkowa: doskonała / 8
 Rozkład suchej masy: średni / 6,5
 Odmiana czipsowa: dobra / 7
 Poziom TGA: 6,0



Zalecenia uprawowe

Nawożenie ¹

Azot: standardowe zalecenie - 10%.

Fosfor: standardowe zalecenie.

Potas: standardowe zalecenie + 25%.

Zaprawianie nasion

Zalecany jest krótki szok termiczny lub odpowiednie podkiełkowanie. Obrywanie kiełków więcej niż jeden raz może mieć negatywny wpływ na regularność plonu i wielkość bulw.

Odległość rozsadzania

28/35 mm: 25 cm (55.000 roślin/ha)

35/55 mm: 34 cm (40.000 roślin/ha)

Chwasty

Po wzejściu nie należy stosować metrybuzyny (Sencor), ponieważ powoduje to poważną reakcję liści i prowadzi do znacznego zmniejszenia plonu.

Fungicydy

Niezbędny jest ścisły harmonogram oprysków prewencyjnych przeciwko zarazie ziemniaczanej.

Zbiór

Ze względu na wyniki w zakresie wrażliwości na ciemną plamistość i/lub uszkodzenia podczas zbioru, po desykacji należy poczekać co najmniej trzy tygodnie przed zbiorami.

Temperatura przechowywania - Okres przechowywania

Na potrzeby przetwarzania nie przechowywać w temperaturze poniżej 7°C. Do przechowywania długoterminowego.



Say potato,
say **Agrico.**

Odporność

Wirus - Liścioszów: - / -

Wirus - Yn: bardzo podatne / 4,5

Wirus - Yntn (bulwy): - / -

Nekrotyczne plamki: nieznacznie podatne / 7,5

Zaraza ziemniaczana - liście: bardzo podatne / 4

Zaraza ziemniaczana - bulwy: nieznacznie podatne / 7,5

Fusarium: nieznacznie podatne / 6

Parch zwykły: podatne / 5,5

Parch prószysty ziemniaka: podatne / 5,5

Antraknoza ziemniaka: podatne / 5,5

Erwinia: - / -

Rak ziemniaczany F1: nieznacznie podatne / 9

Rak ziemniaczany F6: - / -

Rak ziemniaczany F18: - / -

Mątwik ziemniaczany Ro 1/4: odporne / 9

Mątwik ziemniaczany Ro 2/3: nieznacznie podatne / 7

R_Golden nematode Ro 5: umiarkowanie podatne* / 6*

Mątwik agresywny Pa 2: odporne / 9

Mątwik agresywny Pa 3: nieznacznie podatne / 8