


# Paradiso.



Tradycyjny  
Tradycyjne

Wczesny odmiana, duże bulwy o doskonałym plonie na rynek tradycyjny.

- ▶ **Wielkie bulwy**
- ▶ **Piękny wygląd**
- ▶ **Dobra tolerancja na obicia**



## Cechy charakterystyczne

### Ogólne cechy charakterystyczne

Hodowca: M. Pot & M. Klaver  
Krzyżowanie: RODEO x VALOR  
Sadzonka: PK 06-0108

### Cechy charakterystyczne rośliny i bulwy

Dojrzałość: średnio późna / 5,5  
Kolor kielków: czerwony / R  
Kolor kwiatów: purpurowy / P  
Liczba jagód: poniżej średniej / 6,5  
Liście – rozwój początkowy: dość szybki / 7,5  
Liście – rozwój końcowy: dość dobry / 7,5  
Liście – twardość: dość mocne / 7  
Kolor skórki: żółty / Y  
Kolor miąższu: jasnożółty / 6  
Wygląd skórki: dobry / 7  
Kształt bulwy: owalno-podłużny / OL  
Regularność kształtu bulwy: dość regularne / 6,5  
Zawijanie bulw: średnie / 6  
Wielkość bulwy: duża / 8  
Regularność wielkości: dość regularne / 6,5  
Okres spoczynku: średni / 6

### Wrażliwość i jakość

Wtórna wegetacja: nieznacznie wrażliwe / 7  
Czarna plamistość (uszkodzenia wewnętrzne): nieznacznie wrażliwe / 7,5  
Pęknięcia podczas wzrostu: dość wrażliwe / 6,5  
Uszkodzenia podczas zbioru: dość wrażliwe / 6,5  
Etylen: 5% do 15% więcej bulw / 6  
Ciężar pod wodą: 329  
Zawartość suchej masy: 18,2%  
Typ kulinarny: raczej mączysty / B  
Szare przebarwienia (po ugotowaniu): dość wrażliwe / 6,5  
Przebarwienie: - / -  
Odmiana frytkowa: nieodpowiednia / 4,5  
Rozkład suchej masy: - / -  
Odmiana cipsowa: nieodpowiednia / 4  
Poziom TGA: 4,8



# Zalecenia uprawowe

## Nawożenie <sup>1</sup>

**Azot:** standardowe zalecenie - 20%. Najlepiej w formie aplikacji dzielonej, z drugą dawką tuż po wytworzeniu się bulw.

**Fosfor:** standardowe zalecenie.

**Potas:** standardowe zalecenie.

## Zaprawianie nasion

Obrywanie kielków może mieć negatywny wpływ na regularność plonu i wielkość bulw.

## Odległość rozsadzania

28/35 mm: 23 cm (58.000 roślin/ha)

35/55 mm: 33 cm (40.000 roślin/ha)

## Chwasty

Standardowe zastosowanie metrybuzyny (Sencor) po wzejściu nie powoduje reakcji liści ani nie zmniejsza plonu.

## Fungicydy

Zalecany jest harmonogram oprysków prewencyjnych przeciwko zarazie ziemniaczanej.

## Zbiór

Ze względu na wyniki w zakresie wrażliwości na ciemną plamistość i/lub uszkodzenia podczas zbioru, po desykacji należy czekać co najmniej dwa tygodnie przed zbiorami.

## Temperatura przechowywania - Okres przechowywania

Zalecana temperatura przechowywania wynosi 4°C. Do średnioterminowego przechowywania.



Say potato,  
say **Agrico.**

## Odporność

Wirus - Liściozwój: - / -

Wirus - Yn: nieznacznie podatne / 6

Wirus - Yntn (bulwy): nieznacznie podatne / 7,5

Nekrotyczne plamki: bardzo podatne / 4

Zaraza ziemniaczana - liście: podatne / 5,5

Zaraza ziemniaczana - bulwy: nieznacznie podatne / 6,5

Fusarium: podatne / 5

Parch zwykły: podatne / 5,5

Parch prószysty ziemniaka: nieznacznie podatne / 7,5

Antraknoza ziemniaka: podatne / 5,5

Erwinia: - / -

Rak ziemniaczany F1: odporne / 10

Rak ziemniaczany F6: - / -

Rak ziemniaczany F18: - / -

Mątwik ziemniaczany Ro 1/4: odporne / 9

Mątwik ziemniaczany Ro 2/3: - / -

Mątwik agresywny Pa 2: - / -

Mątwik agresywny Pa 3: - / -