ZALECENIA DOTYCZĄCE UPRAW

Impala.

Wczesna odmiana konsumpcyjna o dobrej odporności na parch zwykły i o dobrym plonie.

- **Duże bulwy**
- **Wszechstronna odporność**
- **Dobra odporność na obicia i uszkodzenia**

Tradycyjny
Tradycyjne

characteristics

Ogólne cechy charakterystyczne

Hodowca: Böhm

Krzyżowanie: BM 72-0052 x BIRANCO

Prawa hodowcy: Wygasło

Sadzonka: BM 78-0286

Cechy charakterystyczne rośliny i bulwy

Dojrzałość: wczesna / 7,5

Kolor kiełków: czerwono-fioletowy / RV

Kolor kwiatów: biały / W

Liczba jagód: średnia / 6

Liście – rozwój początkowy: dość szybki / 7,5

Liście – rozwój końcowy: dobry / 8

Liście – twardość: średnie / 6

Kolor skórki: żółty / Y

Kolor miąższu: jasnożółty / 6,5

Wygląd skórki: dobry / 7

Kształt bulwy: owalno-podłużny / OL

Regularność kształtu bulwy: dość regularne / 6,5

Zawiązywanie bulw: średnie / 6

Wielkość bulwy: duża / 8

Regularność wielkości: regularne / 7

Okres spoczynku: średni / 6

Wrażliwość i jakość

Wtórna wegetacja: dość wrażliwe / 6

Czarna plamistość (uszkodzenia wewnętrzne): nieznacznie wrażliwe do niewrażliwe / 8

Pęknięcia podczas wzrostu: dość wrażliwe / 6

Uszkodzenia podczas zbioru: nieznacznie wrażliwe / 7

Metrybuzyna Przedwschodowo: nieznacznie wrażliwe do niewrażliwe / 8

Metrybuzyna Powschodowo: nieznacznie wrażliwe do niewrażliwe / 8

Bentazon: - / -

Etylen: - / -

Ciężar pod woda: 322

Zawartość suchej masy: 17,8%

Typ kulinarny: zwięzły / A

Szare przebarwienia (po ugotowaniu): dość wrażliwe / 6,5

Przebarwienie: - / -

Odmiana frytkowa: nieodpowiednia / 5

Rozkład suchej masy: - / -

Odmiana czipsowa: nieodpowiednia / 4

Poziom TGA: -

Firma Agrico dołożyła wszelkich starań, aby stworzyć ten opis odmiany. Należy jednak pamiętać o tym, że wszelkie informacje mogą ulec zmianie, a firma Agrico nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub pominięcia. Firma Agrico w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające lub związane z informacjami zawartymi w niniejszym opisie.

AGRICO

ZALECENIA DOTYCZĄCE UPRAW

How to grow

Nawożenie [1]

Azot: standardowe zalecenie - 20%.

Fosfor: standardowe zalecenie.

Potas: standardowe zalecenie.

Zaprawianie nasion

Można sadzić bezpośrednio po wyciągnięciu z chłodni, najlepiej po krótkim szoku termicznym.Obrywanie kiełków więcej niż jeden raz może mieć negatywny wpływ na regularność plonu i wielkość bulw.

Planting distance

28/35 mm: 25 cm (54.000 roślin/ha)

35/55 mm: 30 cm (45.000 roślin/ha)

Chwasty

Standardowe zastosowanie metrybuzyny (Sencor) po wzejściu nie powoduje reakcji liści ani nie zmniejsza plonu.

Fungicydy

Niezbędny jest ścisły harmonogram oprysków prewencyjnych przeciwko zarazie ziemniaczanej.

Zbiór

Ze względu na wyniki w zakresie wrażliwości na ciemną plamistość i/lub uszkodzenia podczas zbioru, po desykacji należy zaczekać co najmniej dwa tygodnie przed zbiorami.

Temperatura przechowywania - Okres przechowywania

Zalecana temperatura przechowywania wynosi 5ºC. Do średnioterminowego przechowywania.

©Agrico 2022-04

Say potato, say Agrico.

Odporność

Wirus – Liściozwój: nieznacznie podatne / 6

Wirus – Yn: nieznacznie podatne / 6

Wirus – Yntn (bulwy): nieznacznie podatne / 7

Nekrotyczne plamki: podatne / 5

Zaraza ziemniaczana – liście: bardzo podatne / 4

Zaraza ziemniaczana – bulwy: nieznacznie podatne / 6

Fusarium: bardzo podatne / 4,5

Parch zwykły: nieznacznie podatne / 6

Parch prószysty ziemniaka: bardzo podatne / 3

Antraknoza ziemniaka: - / -

Erwinia: podatne / 5

Rak ziemniaczany F1: odporne / 10

Rak ziemniaczany F6: - / -

Rak ziemniaczany F18: - / -

Mątwik ziemniaczany Ro 1/4: odporne / 9

Mątwik ziemniaczany Ro 2/3: - / -

Mątwik agresywny Pa 2: - / -

Mątwik agresywny Pa 3: - / -

Agrico • Duit 15 • 8305 BB Emmeloord • The Netherlands +31 (0)527 63991 info@agrico.nl www.agricopotatoes.com