

Ranomi.

Wczesna odmiana konsumpcyjna o stosunkowo dobrej odporności na parch zwykły oraz o wczesnej i dobrej plenności.




**Handel
detaliczny**
Produkty
świeże



Tradycyjny
Tradycyjne

- ▶ **Ładny wygląd skórki**
- ▶ **Duże bulwy**
- ▶ **Dość zwięzły miąższ po ugotowaniu**



Cechy charakterystyczne

Ogólne cechy charakterystyczne

Hodowca: Agrico Research B.V.

Krzyżowanie: AR 93-033-79 x AR 95-0319

Prawa hodowcy: 31-12-2044

Sadzonka: AR 03-0221

Cechy charakterystyczne rośliny i bulwy

Dojrzałość: wczesna / 7,5

Kolor kielków: czerwono-fioletowy / RV

Kolor kwiatów: biały / W

Liczba jagód: średnia / 6

Liście - rozwój początkowy: dość szybki / 7,5

Liście - rozwój końcowy: średni / 7

Liście - twardość: średnie / 6,5

Kolor skórki: żółty / Y

Kolor miąższu: jasnożółty / 6,5

Wygląd skórki: dobry / 7

Kształt bulwy: owalno-podłużny / OL

Regularność kształtu bulwy: regularne / 7

Zawijanie bulw: średnie / 6

Wielkość bulwy: dość duża / 7

Regularność wielkości: regularne / 7

Okres spoczynku: średni / 6

Wrażliwość i jakość

Wtórna wegetacja: dość wrażliwe / 6

Czarna plamistość (uszkodzenia wewnętrzne): nieznacznie wrażliwe do niewrażliwe / 8

Pęknięcia podczas wzrostu: dość wrażliwe / 6,5

Uszkodzenia podczas zbioru: dość wrażliwe / 6

Metrybuzyna Przedwschodowo: wrażliwe / 5

Metrybuzyna Powschodowo: dość wrażliwe / 6

Bentazon: nieznacznie wrażliwe / 7

Etylen: 5% do 15% więcej bulw / 6

Ciężar pod wodą: 322

Zawartość suchej masy: 17,9%

Typ kulinarny: raczej zwięzły / AB

Szare przebarwienia (po ugotowaniu): dość wrażliwe / 6

Przebarwienie: - / -

Odmiana frytkowa: powyżej średniej / 6,5

Rozkład suchej masy: - / -

Odmiana chipsowa: nieodpowiednia / 5

Poziom TGA: 4,08



Zalecenia uprawowe

Nawożenie ¹

Azot: standardowe zalecenie. Najlepiej w formie aplikacji dzielonej, z drugą dawką tuż po wytworzeniu się bulw.

Fosfor: standardowe zalecenie.

Potas: standardowe zalecenie + 10%.

Zaprawianie nasion

Można sadzić bezpośrednio po wyciągnięciu z chłodni, najlepiej po krótkim szoku termicznym. Obrywanie kielków więcej niż jeden raz może mieć negatywny wpływ na regularność plonu i wielkość bulw.

Odległość rozsadzania

28/35 mm: 25 cm (54.000 roślin/ha)

35/55 mm: 30 cm (45.000 roślin/ha)

Chwasty

Standardowe zastosowanie metrybuzyny (Sencor) po wzejściu może powodować pewną reakcję liści i w pewnym stopniu prowadzić do zmniejszenia plonu.

Fungicydy

Niezbędny jest ścisły harmonogram oprysków prewencyjnych przeciwko zarazie ziemniaczanej.

Zbiór

Ze względu na wyniki w zakresie wrażliwości na ciemną plamistość i/lub uszkodzenia podczas zbioru, po desykacji należy poczekać co najmniej dwa tygodnie przed zbiorami.

Temperatura przechowywania - Okres przechowywania

Zalecana temperatura przechowywania wynosi 4°C. Do dostawy prosto z pola lub do przechowywania krótkoterminowego.



Sav potato,
Say potato,
say **Agrico.**

Odporność

Wirus - Liścizwój: - / -

Wirus - Yn: podatne / 5,5

Wirus - Yntn (bulwy): nieznacznie podatne / 6

Nekrotyczne plamki: nieznacznie podatne / 6,5

Zaraza ziemniaczana - liście: bardzo podatne / 4

Zaraza ziemniaczana - bulwy: nieznacznie podatne / 6

Fusarium: podatne / 5

Parch zwykły: nieznacznie podatne / 6,5

Parch prószysty ziemniaka: bardzo podatne / 4,5

Antraknoza ziemniaka: nieznacznie podatne / 7

Erwinia: - / -

Rak ziemniaczany F1: odporne / 10

Rak ziemniaczany F6: - / -

Rak ziemniaczany F18: - / -

Mątwik ziemniaczany Ro 1/4: odporne / 9

Mątwik ziemniaczany Ro 2/3: - / -

Mątwik agresywny Pa 2: - / -

Mątwik agresywny Pa 3: - / -