

Jamaica.

Variedade precoce, para o mercado tradicional, com bom calibre e bom acabamento de pele.



Retalho
Fresco



Tradicional

Image:

- » **Boa produtividade**
- » **Bom acabamento de pele**
- » **Bom calibre**

CARACTERÍSTICAS

Características

Obtentor: Agrico Research B.V.

Cruzamento: OS 07-0020 x SAVIOLA

Direito do obtentor: Pendente

Clone: AR 14-0334

Características da planta e dos tubérculos

Maturação: precoce / 7,5

Brolho de cor clara: - / -

Cor da flor: branca / W

Número de bagas: superior à média / 5

Folhagem - desenvolvimento inicial: rápido / 8

Folhagem - desenvolvimento final: bastante bom / 7,5

Firmeza da folhagem: média / 6,5

Cor da pele: amarela / Y

Cor da polpa: amarela clara / 6,5

Acabamento de pele: boa / 7

Forma dos tubérculos: oval alongada / OL

Regularidade da forma: regular / 7

Tuberização: média / 6

Calibre dos tubérculos: grande / 8

Regularidade do calibre: regular / 7

Dormência: média a curta / 5,5

Sensibilidade e qualidade

Segundos crescimentos: moderadamente sensível / 6,5

Manchas negras: ligeiramente sensível a não sensível / 8

Rachamentos: moderadamente sensível / 6,5

Danos mecânicos: moderadamente sensível / 6

Metribuzina: muito sensível / 3

Metribuzina: muito sensível / 3

Etileno: - / -

Peso debaixo de água: 332

Teor de matéria seca: 18,3%

Grupo culinário: moderadamente firme / AB

Descoloração após cozedura: - / -

Descoloração em cru: - / -

Qualidade para fritura em palitos: - / -

Distribuição da matéria seca: - / -

Qualidade para fritura em rodela: - / -

Nível TGA: 15

CONSELHOS DE CULTIVO



www.agricopotatoes.pt

Preparação da plantação ¹

Azoto: conselho padrão. Dividir a fertilização, fazendo a segunda aplicação pouco depois da tuberação.

Fósforo: conselho padrão.

Potássio: conselho padrão.

Tratamento da semente

Recomenda-se fazer um curto choque térmico ou pré-abrolhamento.

Distância de plantação

28/35 mm: 20 cm (67.000 plants/ha)

35/50 mm: 27 cm (50.000 plants/ha)

¹ O nível de fertilização é baseado na análise de solo.

Ervas daninhas

Após a emergência não aplicar metribuzina, pois o seu uso provoca severa reação foliar e grande perda de rendimento.

Fungicidas

É necessário fazer um apertado calendário de tratamentos contra o míldio.

Colheita

Devido à sua sensibilidade a manchas negras e danos mecânicos, esperar pelo menos 2 semanas para colher, após a aplicação do dessecante.

Temperatura de armazenamento - Tempo de armazenamento

A temperatura preferencial de armazenamento é de 4°C. Adequada para expedição diretamente do campo ou curto armazenamento.

Image:

Say potato,
say Agrico.

Resistências

Vírus do enrolamento: - / -

Vírus Yn: ligeiramente suscetível a não suscetível / 8

Vírus - Yntn (tubérculo): ligeiramente suscetível / 6

TRV: ligeiramente suscetível / 6,5

Míldio da folha: muito suscetível / 3,5

Míldio do tubérculo: ligeiramente suscetível / 6

Fusarium: - / -

Sarna comum: suscetível / 5,5

Sarna pulverulenta: - / -

Antracnose: - / -

Verruga negra F1: resistente* / 10*

Verruga negra F6: - / -

Verruga negra F18: - / -

Nemátode dourado Ro 1/4: suscetível* / 1*

Nemátode dourado Ro 2/3: - / -

Nemátode, Globodera pallida Pa 2: - / -

Nemátode, Globodera pallida Pa 3: - / -