

Oregon (AR 14-3578).



Indústria
Rodelas

Variedade tardia para batatas fritas às rodelas, com boa uniformidade dos tubérculos em forma e calibre e bom teor de matéria seca.

- ▶ **Forma e calibre regulares**
- ▶ **Boa qualidade para batatas fritas às rodelas, mesmo após armazenamento prolongado**
- ▶ **Poucos defeitos nos tubérculos**



CARACTERÍSTICAS

Características

Obtentor: Agrico Research B.V.
Cruzamento: LEANDRA x VR 808
Direito do obtentor: Pendente
Clone: AR 14-3578

Características da planta e dos tubérculos

Maturação: tardia / 5
Brolho de cor clara: - / -
Cor da flor: roxa clara / LP
Número de bagas: - / -
Folhagem - desenvolvimento inicial: bastante rápido / 7
Folhagem - desenvolvimento final: bom / 8
Firmeza da folhagem: bastante firme / 7,5
Cor da pele: amarela / Y
Cor da polpa: amarela clara / 6
Acabamento de pele: inferior á média / 5,5
Forma dos tubérculos: oval redonda / OR
Regularidade da forma: bastante regular / 6,5
Tuberização: média / 6
Calibre dos tubérculos: médio a grande / 7,5
Regularidade do calibre: regular / 7
Dormência: média / 6,5

Sensibilidade e qualidade

Segundos crescimentos: moderadamente sensível / 6
Manchas negras: ligeiramente sensível / 7
Rachamentos: moderadamente sensível / 6,5
Danos mecânicos: sensível / 5
Metribuzina: ligeiramente sensível / 7
Metribuzina: ligeiramente sensível / 7,5
Etileno: - / -
Peso abaixo de água: 465
Teor de matéria seca: 24,9%
Grupo culinário: farinhenta / BC
Descoloração após cozedura: sensível / 5
Descoloração em cru: moderadamente sensível / 6,5
Qualidade para fritura em palitos: superior à média / 6,5
Distribuição da matéria seca: bastante baixa / 5
Qualidade para fritura em rodelas: boa / 7
Nível TGA: -

CONSELHOS DE CULTIVO



www.agricopotatoes.pt

Preparação da plantação ¹

Azoto: conselho padrão. Dividir a fertilização em três aplicações, fazendo a segunda pouco depois da tubérização.

Fósforo: conselho padrão.

Potássio: conselho padrão + 10%.

Tratamento da semente

Preferencialmente, plantar os tubérculos em solo quente, uma vez que o desenvolvimento desta variedade é lento.

Distância de plantação

30/50 mm: 30 cm (45.000 plants/ha)

¹ O nível de fertilização é baseado na análise de solo.

Ervas daninhas

Após a emergência, uma utilização padrão de metribuzina pode provocar reações na folhagem ou perda de rendimento, mas raramente perda de produção.

Fungicidas

É necessário fazer um apertado calendário de tratamentos contra o míldio.

Colheita

Devido à sua sensibilidade a manchas negras e danos mecânicos, esperar pelo menos 2 semanas para colher, após a aplicação do dessecante.

Temperatura de armazenamento - Tempo de armazenamento

A temperatura preferencial de armazenamento é de 9 °C. Adequada para armazenamento de médio a longo prazo.



Resistências

Vírus do enrolamento: - / -

Vírus Yn: ligeiramente suscetível a não suscetível / 8

Vírus - Yntn (tubérculo): - / -

TRV: suscetível / 5

Míldio da folha: muito suscetível / 4,5

Míldio do tubérculo: suscetível / 5

Fusarium: - / -

Sarna comum: ligeiramente suscetível / 6,5

Say potato,
say Agrico.

Sarna pulverulenta: - / -

Antracnose: - / -

Verruga negra F1: muito suscetível* / 1*

Verruga negra F6: muito suscetível* / 1*

Verruga negra F18: - / -

Nemátode dourado Ro 1/4: resistente / 9

Nemátode dourado Ro 2/3: - / -

Nemátode, Globodera pallida Pa 2: - / -

Nemátode, Globodera pallida Pa 3: - / -