

Feliz (SW 14-7008).



**Retalho
Salada**

Variedade de salada, semiprecoce, com tubérculos ovais alongados, grupo culinário A e forte resistência ao PVY.

- ▶ **Bom acabamento de pele**
- ▶ **Grupo culinário A**
- ▶ **Boa resistência ao PVY**



CARACTERÍSTICAS

Características

Obtentor: Lantmännen Seed B.V.

Cruzamento: LORELEY x SW 06-0296

Direito do obtentor: Pendente

Clone: SW 14-7008

Características da planta e dos tubérculos

Maturação: semiprecoce / 7

Brolho de cor clara: - / -

Cor da flor: branca / W

Número de bagas: - / -

Folhagem - desenvolvimento inicial: rápido / 8

Folhagem - desenvolvimento final: bom / 8

Firmeza da folhagem: bastante firme / 7

Cor da pele: amarela / Y

Cor da polpa: amarela clara / 6,5

Acabamento de pele: boa / 7

Forma dos tubérculos: oval alongada / OL

Regularidade da forma: bastante regular / 6,5

Tuberização: alta / 8

Calibre dos tubérculos: médio / 6,5

Regularidade do calibre: bastante regular / 6,5

Dormência: média / 6

Sensibilidade e qualidade

Segundos crescimentos: moderadamente sensível / 6

Manchas negras: ligeiramente sensível a não sensível / 8

Rachamentos: ligeiramente sensível / 7

Danos mecânicos: ligeiramente sensível a não sensível / 8

Metribuzina: ligeiramente sensível / 7,5

Metribuzina: ligeiramente sensível / 7,5

Etileno: 5% a 15% mais tubérculos / 6

Peso debaixo de água: 358

Teor de matéria seca: 19,6%

Grupo culinário: firme / A

Descoloração após cozedura: - / -

Descoloração em cru: muito sensível / 4

Qualidade para fritura em palitos: - / -

Distribuição da matéria seca: - / -

Qualidade para fritura em rodela: - / -

Nível TGA: -

CONSELHOS DE CULTIVO



www.agricopotatoes.pt

Preparação da plantação ¹

Azoto: conselho padrão. Dividir a fertilização em três aplicações, fazendo a segunda pouco depois da tubérização.

Fósforo: conselho padrão.

Potássio: conselho padrão.

Tratamento da semente

Recomenda-se fazer um curto choque térmico ou pré-abrolhamento. Desgrelar pode ter um efeito negativo no rendimento e na regularidade do calibre.

Distância de plantação

30/50 mm: 20 cm (67.000 plants/ha)

¹ O nível de fertilização é baseado na análise de solo.

Ervas daninhas

Após a emergência, uma utilização padrão de metribuzina pode provocar reações na folhagem ou perda de rendimento, mas raramente perda de produção.

Fungicidas

É necessário fazer um apertado calendário de tratamentos contra o míldio.

Colheita

Devido à sua sensibilidade a manchas negras e danos mecânicos, esperar pelo menos 2 semanas para colher, após a aplicação do dessecante.

Temperatura de armazenamento - Tempo de armazenamento

A temperatura preferencial de armazenamento é de 4°C. Adequada para períodos médios de armazenamento.



Say potato,
say Agrico.

Resistências

Vírus do enrolamento: - / -

Vírus Yn: ligeiramente suscetível / 7

Vírus - Yntn (tubérculo): - / -

TRV: muito suscetível / 4

Míldio da folha: muito suscetível / 3,5

Míldio do tubérculo: suscetível / 5,5

Fusarium: - / -

Sarna comum: suscetível / 5

Sarna pulverulenta: - / -

Antracnose: - / -

Verruga negra F1: resistente* / 10*

Verruga negra F6: - / -

Verruga negra F18: - / -

Nemátode dourado Ro 1/4: resistente / 9

Nemátode dourado Ro 2/3: suscetível* / 4*

Nemátode, *Globodera pallida* Pa 2: moderadamente suscetível* / 5*

Nemátode, *Globodera pallida* Pa 3: suscetível* / 3*