RECOMENDAÇÃO DE CULTIVO

Feliz (SW 14-7008).

Variedade de batata para salada, semiprecoce, com tubérculos ovais alongados, grupo culinário A e forte resistência ao PVY.

- **Bom acabamento de pele**
- **Grupo culinário A**
- **Boa resistência ao PVY**

Retalho
Salada



Características

Características

Obtentor: Lantmännen Seed B.V.
Cruzamento: LORELEY x SW 06-0296
Direito do obtentor: Pendente
Clone: SW 14-7008

Características da planta e dos tubérculos

Maturação: semiprecoce / 7
Brolho de cor clara: - / -
Cor da flor: branca / W
Número de bagas: - / -
Folhagem - desenvolvimento inicial: rápido / 8
Folhagem - desenvolvimento final: bom / 8
Firmeza da folhagem: bastante firme / 7
Cor da pele: amarela / Y
Cor da polpa: amarela clara / 6,5
Acabamento de pele: boa / 7
Forma dos tubérculos: oval alongada / OL
Regularidade da forma: bastante regular / 6,5
Tuberização: alta / 8
Calibre dos tubérculos: médio / 6,5
Regularidade do calibre: bastante regular / 6,5
Dormência: média a curta / 5,5

Sensibilidade e qualidade

Segundos crescimentos: moderadamente sensível / 6
Manchas negras: ligeiramente sensível a não sensível / 8
Rachamentos: ligeiramente sensível / 7
Danos mecânicos: ligeiramente sensível a não sensível / 8
Metribuzina: ligeiramente sensível / 7,5
Metribuzina: ligeiramente sensível / 7,5
Etileno: 5% a 15% mais tubérculos / 6
Peso debaixo de água: 358
Teor de matéria seca: 19,6%
Grupo culinário: firme / A
Descoloração após cozedura: ligeiramente sensível / 7
Descoloração em cru: muito sensível / 4
Qualidade para fritura em palitos: - / -
Distribuição da matéria seca: - / -
Qualidade para fritura em rodelas: - / -
Nível TGA: -

A Agrico tomou todos os cuidados na elaboração da descrição desta variedade. No entanto, toda a informação pode estar sujeita a alterações e a Agrico não se responsabiliza por erros ou omissões. A Agrico não se responsabiliza por danos relacionados com as informações contidas nesta descrição.

AGRICO

RECOMENDAÇÃO DE CULTIVO

Conselhos de cultivo

www.agricopotatoes.pt

Preparacão da plantacão [1]

Azoto: conselho padrão.Dividir a fertilização em três aplicações, fazendo a segunda pouco depois da tuberização.

Fósforo: conselho padrão.

Potássio: conselho padrão.

Tratamento da semente

Recomenda-se fazer um curto choque térmico ou pré-abrolhamento.Desgrelar pode ter um efeito negativo no rendimento e na regularidade do calibre.

Distância de plantação

30/50 mm: 20 cm (67.000 plantas/ha)

40/50 mm: 27 cm (50.000 plantas/ha)

[1] O nível de fertilização é baseado na análise de solo.

Ervas daninhas

Após a emergência, uma utilização padrão de metribuzina pode provocar reações na folhagem ou perda de rendimento, mas raramente perda de produção.

Fungicidas

É necessário fazer um apertado calendário de tratamentos contra o míldio.

Colheita

Devido à sua sensibilidade a manchas negras e danos mecânicos, esperar pelo menos 2 semanas para colher, após a aplicação do dessecante.

Temperatura de armazenamento - Tempo de armazenamento

A temperatura preferencial de armazenamento é de 5ºC. Adequada para períodos médios de armazenamento.



Say potato, say Agrico.

Resistências

Vírus do enrolamento: - / -

Vírus Yn: ligeiramente suscetível / 7

Vírus - Yntn (tubérculo): ligeiramente suscetível a não suscetível / 8

TRV: muito suscetível / 4

Míldio da folha: muito suscetível / 3,5

Míldio do tubérculo: suscetível / 5,5

Fusarium: - / -

Sarna comum: suscetível / 5

Sarna pulverulenta: - / -

Antracnose: - / -

Verruga negra F1: resistente* / 10*

Verruga negra F6: - / -

Verruga negra F18: - / -

Nemátode dourado Ro 1/4: resistente / 9

Nemátode dourado Ro 2/3: suscetível* / 4*

Nemátode, Globodera pallida Pa 2: moderadamente suscetível* / 5*

Nemátode, Globodera pallida Pa 3: suscetível* / 3*

Agrico • Duit 15 • 8305 BB Emmeloord • Holanda +31 (0)527 63 99 11 info@agrico.nl www.agricopotatoes.pt