RECOMENDAÇÃO DE CULTIVO

Texas (AR 14-3488).

Variedade de batata tardia, altamente produtiva, para a indústria de batatas fritas aos palitos, adequada para cultura em diferentes tipos de solo.

- **Alta produtividade**
- **Alto teor de matéria seca**
- **Resistência múltipla à verruga negra**

Indústria
Palitos



Características

Características

Obtentor: Agrico Research B.V.
Cruzamento: LEANDRA x AR 07-4113
Direito do obtentor: Pendente
Clone: AR 14-3488

Características da planta e dos tubérculos

Maturação: semitardia / 5,5
Brolho de cor clara: - / -
Cor da flor: branca / W
Número de bagas: médio / 6
Folhagem - desenvolvimento inicial: bastante rápido / 7,5
Folhagem - desenvolvimento final: bom / 8
Firmeza da folhagem: bastante firme / 7,5
Cor da pele: amarela / Y
Cor da polpa: amarela clara / 6
Acabamento de pele: inferior á média / 5,5
Forma dos tubérculos: oval alongada / OL
Regularidade da forma: regular / 7
Tuberização: média / 6
Calibre dos tubérculos: médio a grande / 7,5
Regularidade do calibre: bastante regular / 6,5
Dormência: média / 6

Sensibilidade e qualidade

Segundos crescimentos: moderadamente sensível / 6,5
Manchas negras: ligeiramente sensível / 7
Rachamentos: ligeiramente sensível / 7
Danos mecânicos: sensível / 5
Metribuzina: ligeiramente sensível / 7
Metribuzina: ligeiramente sensível / 7,5
Etileno: - / -
Peso debaixo de água: 427
Teor de matéria seca: 23%
Grupo culinário: farinhenta / C
Descoloração após cozedura: sensível / 5,5
Descoloração em cru: muito sensível / 4,5
Qualidade para fritura em palitos: excelente / 8
Distribuição da matéria seca: média / 6,5
Qualidade para fritura em rodelas: - / -
Nível TGA: -

A Agrico tomou todos os cuidados na elaboração da descrição desta variedade. No entanto, toda a informação pode estar sujeita a alterações e a Agrico não se responsabiliza por erros ou omissões. A Agrico não se responsabiliza por danos relacionados com as informações contidas nesta descrição.

RECOMENDAÇÃO DE CULTIVO

Conselhos de cultivo

www.agricopotatoes.pt

Preparacão da plantacão [1]

Azoto: conselho padrão.Dividir a fertilização, fazendo a segunda aplicação pouco depois da tuberização.

Fósforo: conselho padrão.

Potássio: conselho padrão.

Tratamento da semente

Pode ser plantada imediatamente após retirada da câmara de frio, de preferência após curto choque térmico.

Distância de plantação

28/35 mm: 27 cm (50.000 plantas/ha)
35/50 mm: 33 cm (40.000 plantas/ha)
50/55 mm: 40 cm (33.000 plantas/ha)

[1] O nível de fertilização é baseado na análise de solo.

Ervas daninhas

Após a emergência, uma utilização padrão de metribuzina pode provocar reações na folhagem ou perda de rendimento, mas raramente perda de produção.

Fungicidas

É necessário fazer um apertado calendário de tratamentos contra o míldio.

Colheita

Devido à sua sensibilidade a manchas negras e danos mecânicos, esperar pelo menos 2 semanas para colher, após a aplicação do dessecante.

Temperatura de armazenamento - Tempo de armazenamento

Para fins industriais não armazenar a temperatura inferior a 7 ºC. Adequada para períodos longos de armazenamento.



Say potato, say Agrico.

Resistências

Vírus do enrolamento: - / -
Vírus Yn: ligeiramente suscetível / 6,5
Vírus - Yntn (tubérculo): ligeiramente suscetível / 6
TRV: suscetível / 5
Míldio da folha: muito suscetível / 4
Míldio do tubérculo: suscetível / 5,5
Fusarium: - / -
Sarna comum: suscetível / 5,5
Sarna pulverulenta: - / -
Antracnose: - / -
Verruga negra F1: resistente / 10
Verruga negra F6: resistente* / 10*
Verruga negra F18: resistente / 10
Nemátode dourado Ro 1/4: resistente / 9
Nemátode dourado Ro 2/3: - / -
Nemátode, Globodera pallida Pa 2: - / -
Nemátode, Globodera pallida Pa 3: - / -

Agrico • Duit 15 • 8305 BB Emmeloord • Holanda +31 (0)527 63 99 11 info@agrico.nl www.agricopotatoes.pt