

Texas (AR 14-3488).



Indústria
Palitos

Variedade tardia, altamente produtiva, para a indústria de batatas fritas aos palitos, adequada para cultura em diferentes tipos de solo.

- ▶ **Alta produtividade**
- ▶ **Alto teor de matéria seca**
- ▶ **Resistência múltipla à verruga negra**

Picture not yet available



CARACTERÍSTICAS

Características

Obtentor: Agrico Research B.V.

Cruzamento: LEANDRA x AR 07-4113

Direito do obtentor: Pendente

Clone: AR 14-3488

Características da planta e dos tubérculos

Maturação: semitardia / 5,5

Brolho de cor clara: - / -

Cor da flor: branca / W

Número de bagas: médio / 6

Folhagem - desenvolvimento inicial: bastante rápido / 7,5

Folhagem - desenvolvimento final: bom / 8

Firmeza da folhagem: bastante firme / 7,5

Cor da pele: amarela / Y

Cor da polpa: amarela clara / 6

Acabamento de pele: inferior á média / 5,5

Forma dos tubérculos: oval alongada / OL

Regularidade da forma: regular / 7

Tuberização: média / 6

Calibre dos tubérculos: médio a grande / 7,5

Regularidade do calibre: bastante regular / 6,5

Dormência: média / 6

Sensibilidade e qualidade

Segundos crescimentos: moderadamente sensível / 6,5

Manchas negras: moderadamente sensível / 6,5

Rachamentos: moderadamente sensível / 6,5

Danos mecânicos: sensível / 5

Metribuzina: ligeiramente sensível / 7

Metribuzina: ligeiramente sensível / 7,5

Etileno: - / -

Peso debaixo de água: 427

Teor de matéria seca: 23%

Grupo culinário: farinhenta / C

Descoloração após cozedura: ligeiramente sensível / 7,5

Descoloração em cru: muito sensível / 4,5

Qualidade para fritura em palitos: boa / 7

Distribuição da matéria seca: média / 6,5

Qualidade para fritura em rodela: - / -

Nível TGA: -

CONSELHOS DE CULTIVO



www.agricopotatoes.pt

Preparação da plantação ¹

Azoto: conselho padrão. Dividir a fertilização, fazendo a segunda aplicação pouco depois da tuburização.

Fósforo: conselho padrão.

Potássio: conselho padrão.

Tratamento da semente

Recomenda-se fazer um curto choque térmico ou pré-abrolhamento. Pode ser plantada imediatamente após retirada da câmara de frio, de preferência após curto choque térmico.

Distância de plantação

¹ O nível de fertilização é baseado na análise de solo.

Colheita

Devido à sua sensibilidade a manchas negras e danos mecânicos, esperar pelo menos 2 semanas para colher, após a aplicação do dessecante.



Say potato,
say Agrico.

Resistências

Vírus do enrolamento: - / -

Vírus Yn: ligeiramente suscetível / 6,5

Vírus - Yntn (tubérculo): ligeiramente suscetível / 6

TRV: muito suscetível / 4,5

Míldio da folha: muito suscetível / 4

Míldio do tubérculo: suscetível / 5,5

Fusarium: - / -

Sarna comum: suscetível / 5,5

Sarna pulverulenta: - / -

Antracnose: - / -

Verruga negra F1: resistente / 10

Verruga negra F6: resistente* / 10*

Verruga negra F18: resistente / 10

Nemátode dourado Ro 1/4: resistente / 9

Nemátode dourado Ro 2/3: - / -

Nemátode, Globodera pallida Pa 2: - / -

Nemátode, Globodera pallida Pa 3: - / -