

Janick.

Variedade para fécula com resistência múltipla aos nemátodos e resistente ao míldio da folha e do tubérculo.



Indústria
Fécua

Image:

► **Resistente ao míldio**

Características

Características

Obtentor: AKV Langholt

Cruzamento: SC 05-4661 x AR 02-3921

Clone: PL 13-0304

Características da planta e dos tubérculos

Maturação: tardia / 4

Brolho de cor clara: - / -

Cor da flor: violeta / V

Número de bagas: muito elevado / 4

Folhagem - desenvolvimento inicial: rápido / 8

Folhagem - desenvolvimento final: bom / 8

Firmeza da folhagem: firme / 8

Cor da pele: vermelha / R

Cor da polpa: amarela clara / 6,5

Acabamento de pele: bastante fraca / 5

Forma dos tubérculos: oval redonda / OR

Regularidade da forma: regular / 7

Tuberização: média alta / 7

Calibre dos tubérculos: grande / 8

Regularidade do calibre: regular / 7

Dormência: média a curta / 5,5

Sensibilidade e qualidade

Segundos crescimentos: moderadamente sensível / 6

Manchas negras: moderadamente sensível / 6

Rachamentos: ligeiramente sensível / 7

Danos mecânicos: sensível / 5

Metribuzina: ligeiramente sensível / 7,5

Metribuzina: ligeiramente sensível a não sensível / 8

Etileno: 5% menos a 5% mais tubérculos / 5

Peso debaixo de água: 497

Teor de matéria seca: 26,5%

Grupo culinário: farinhenta / C

Descoloração após cozedura: - / -

Descoloração em cru: - / -

Qualidade para fritura em palitos: - / -

Distribuição da matéria seca: - / -

Qualidade para fritura em rodela: inferior à média / 5,5

Nível TGA: 7,3 mg/100g

S_Harvestability: - / -

Conselhos de cultivo



www.agricopotatoes.pt

Preparação da plantação ¹

Azoto: conselho padrão - 10%. Dividir a fertilização em três aplicações, fazendo a segunda pouco depois da tubérização.

Fósforo: conselho padrão.

Potássio: conselho padrão + 10%.

Tratamento da semente

Pode ser plantada imediatamente após retirada da câmara de frio, de preferência após curto choque térmico. Desgrelar pode ter um efeito negativo no rendimento e na regularidade do calibre.

Distância de plantação

28/35 mm: 25 cm (54.000 plantas/ha)

35/50 mm: 30 cm (45.000 plantas/ha)

¹ O nível de fertilização é baseado na análise de solo.

Ervas daninhas

Após a emergência, uma utilização padrão de metribuzina não provoca reações na folhagem ou perda de rendimento.

Fungicidas

Apesar da resistência ao míldio, deve estar-se alerta a possíveis infeções.

Colheita

Devido à sua sensibilidade a manchas negras e danos mecânicos, esperar pelo menos 3 semanas para colher, após a aplicação do dessecante.

Temperatura de armazenamento - Tempo de armazenamento

A temperatura preferencial de armazenamento é de 4°C. Adequada para armazenamento de médio a longo prazo.

Image:

Say potato,
say Agrico.

Resistências

Vírus do enrolamento: - / -

Vírus Yn: ligeiramente suscetível a não suscetível / 8

Vírus - Yntn (tubérculo): - / -

TRV: ligeiramente suscetível / 6

Míldio da folha: ligeiramente suscetível a não suscetível / 8

Míldio do tubérculo: ligeiramente suscetível a não suscetível / 9

Fusarium: - / -

Sarna comum: ligeiramente suscetível / 6

Sarna pulverulenta: - / -

Antracnose: - / -

R_PCN Tolerance: - / -

Verruga negra F1: muito suscetível* / 1*

Verruga negra F6: muito suscetível* / 1*

Verruga negra F18: muito suscetível* / 1*

Nemátode dourado Ro 1/4: resistente / 9

Nemátode dourado Ro 2/3: moderadamente suscetível / 5

Nemátode, Globodera pallida Pa 2: moderadamente suscetível / 6

Nemátode, Globodera pallida Pa 3: suscetível / 3