

Saprodi.



Indústria
Fécula

Image:

Características

Características

Cruzamento: SCARLET x SOFISTA

Direito do obtentor: 31-12-2044

Clone: SL 04-454

Características da planta e dos tubérculos

Maturação: tardia / 4

Cor da flor: branca / W

Folhagem - desenvolvimento inicial: bastante rápido / 7

Firmeza da folhagem: bastante firme / 7,5

Cor da pele: amarela / Y

Cor da polpa: amarela clara / 6

Acabamento de pele: muito fraca / 4

Forma dos tubérculos: oval redonda / OR

Regularidade da forma: regular / 7

Tuberização: média alta / 7

Calibre dos tubérculos: médio a grande / 7,5

Regularidade do calibre: bastante regular / 6

Dormência: média / 6

Sensibilidade e qualidade

Segundos crescimentos: sensível / 5,5

Manchas negras: muito sensível / 4,5

Rachamentos: - / -

Danos mecânicos: moderadamente sensível / 6,5

Metribuzina: - / -

Metribuzina: - / -

Peso debaixo de água: 554

Teor de matéria seca: 29,3%

Grupo culinário: farinhenta / C

Descoloração após cozedura: sensível / 5,5

Descoloração em cru: - / -

Qualidade para fritura em palitos: muito boa / 7,5

Distribuição da matéria seca: - / -

Qualidade para fritura em rodela: média / 6

Nível TGA: 6,4 mg/100g

S_Harvestability: - / -

Conselhos de cultivo



www.agricopotatoes.pt

Preparação da plantação ¹

Azoto: conselho padrão - 10%. Dividir a fertilização, fazendo a segunda aplicação pouco depois da tuberização. É possível o uso de estrume.

Fósforo: conselho padrão.

Potássio: conselho padrão.

Tratamento da semente

Pode ser plantada imediatamente após retirada da câmara de frio, de preferência após curto choque térmico. Desgrelar mais que uma vez pode ter um efeito negativo no rendimento e na regularidade do calibre.

Distância de plantação

28/35 mm: 25 cm (54.000 plants/ha)

35/55 mm: 33 cm (40.000 plants/ha)

¹ O nível de fertilização é baseado na análise de solo.

Ervas daninhas

Após a emergência, uma utilização padrão de metribuzina não provoca reações na folhagem ou perda de rendimento.

Fungicidas

É aconselhável fazer um calendário de tratamentos preventivos contra o míldio.

Colheita

Devido à sua sensibilidade a manchas negras e danos mecânicos, esperar pelo menos 3 semanas para colher, após a aplicação do dessecante.

Temperatura de armazenamento - Tempo de armazenamento

A temperatura preferencial de armazenamento é de 6 °C. Adequada para armazenamento de curto a médio de prazo.

Image:

Say potato,
say Agrico.

Resistências

Vírus do enrolamento: ligeiramente suscetível / 7

Vírus Yn: - / -

Vírus - Yntn (tubérculo): - / -

TRV: suscetível / 5

Míldio da folha: suscetível / 5

Míldio do tubérculo: ligeiramente suscetível / 7

Fusarium: ligeiramente suscetível / 6

Sarna comum: suscetível / 5,5

Sarna pulverulenta: ligeiramente suscetível / 7

Antracnose: - / -

R_PCN Tolerance: ligeiramente suscetível a não suscetível / 8

Verruga negra F1: resistente / 10

Verruga negra F6: resistente / 10

Verruga negra F18: resistente / 10

Nemátode dourado Ro 1/4: resistente / 9

Nemátode dourado Ro 2/3: resistente / 9

Nemátode, Globodera pallida Pa 2: resistente / 9

Nemátode, Globodera pallida Pa 3: resistente / 9