

Supporter.



Indústria
Fécula

Image:

Características

Características

Cruzamento: SOFISTA x FESTIEN

Direito do obtentor: 31-12-2042

Clone: SL 02-572

Características da planta e dos tubérculos

Maturação: tardia / 4

Cor da flor: branca / W

Número de bagas: médio / 6

Folhagem - desenvolvimento inicial: bastante rápido / 7,5

Folhagem - desenvolvimento final: fraco / 6

Firmeza da folhagem: firme / 8

Cor da pele: amarela / Y

Cor da polpa: branca / 4

Acabamento de pele: bastante fraca / 5

Forma dos tubérculos: oval redonda / OR

Regularidade da forma: bastante regular / 6,5

Tuberização: baixa a média / 5,5

Calibre dos tubérculos: médio a grande / 7,5

Regularidade do calibre: irregular / 4,5

Dormência: média a longa / 7

Sensibilidade e qualidade

Segundos crescimentos: ligeiramente sensível / 7

Manchas negras: muito sensível / 4

Rachamentos: ligeiramente sensível / 7

Danos mecânicos: - / -

Metribuzina: - / -

Metribuzina: - / -

Peso debaixo de água: 564

Teor de matéria seca: 29,7%

Grupo culinário: farinhenta / C

Descoloração após cozedura: muito sensível / 4,5

Descoloração em cru: - / -

Qualidade para fritura em palitos: boa / 7

Distribuição da matéria seca: - / -

Qualidade para fritura em rodela: média / 6

Nível TGA: 7,7 mg/100g

S_Harvestability: sensível / 5,5

Conselhos de cultivo



www.agricopotatoes.pt

Preparação da plantação ¹

Azoto: conselho padrão. É possível o uso de estrume.

Fósforo: conselho padrão.

Potássio: conselho padrão.

Tratamento da semente

Pode ser plantada imediatamente após retirada da câmara de frio, de preferência após curto choque térmico. Desgrelar mais que uma vez pode ter um efeito negativo no rendimento e na regularidade do calibre.

Distância de plantação

28/35 mm: 25 cm (54.000 plants/ha)

35/55 mm: 33 cm (40.000 plants/ha)

¹ O nível de fertilização é baseado na análise de solo.

Ervas daninhas

Após a emergência, uma utilização padrão de metribuzina não provoca reações na folhagem ou perda de rendimento.

Fungicidas

É aconselhável fazer um calendário de tratamentos preventivos contra o míldio.

Colheita

Devido à sua sensibilidade a manchas negras e danos mecânicos, esperar pelo menos 2 semanas para colher, após a aplicação do dessecante.

Temperatura de armazenamento - Tempo de armazenamento

A temperatura preferencial de armazenamento é de 6 °C. Adequada para armazenamento de médio a longo prazo.

Image:

Say potato,
say Agrico.

Resistências

Vírus do enrolamento: ligeiramente suscetível / 7

Vírus Yn: - / -

Vírus - Yntn (tubérculo): - / -

TRV: ligeiramente suscetível / 6

Míldio da folha: ligeiramente suscetível / 6,5

Míldio do tubérculo: ligeiramente suscetível / 6,5

Fusarium: - / -

Sarna comum: suscetível / 5

Sarna pulverulenta: suscetível / 5

Antracnose: - / -

R_PCN Tolerance: - / -

Verruga negra F1: resistente / 10

Verruga negra F6: moderadamente suscetível / 8

Verruga negra F18: ligeiramente suscetível / 9

Nemátode dourado Ro 1/4: resistente / 9

Nemátode dourado Ro 2/3: resistente / 9

Nemátode, Globodera pallida Pa 2: resistente / 9

Nemátode, Globodera pallida Pa 3: resistente / 9