RECOMENDAÇÃO DE CULTIVO

Agata.

Variedade precoce de polpa moderadamente firme quando cozida, com uma pele lisa muito atrente e de alto rendimento.

- **Boa conservação**
- **Boa resistência a vírus**
- **Boa tolerância a manchas negras e danos mecânicos**

Retalho Fresco

Tradicional



Características

Características

Obtentor: Lantmännen Seed B.V.
Cruzamento: BM 72-0052 x SIRCO
Direito do obtentor: Expirado
Clone: GE 77-0134

Características da planta e dos tubérculos

Maturação: muito precoce / 8
Brolho de cor clara: violeta vermelha / RV
Cor da flor: branca / W
Número de bagas: superior à média / 5
Folhagem - desenvolvimento inicial: rápido / 8
Folhagem - desenvolvimento final: bom / 8
Firmeza da folhagem: média / 6
Cor da pele: amarela / Y
Cor da polpa: amarela clara / 6
Acabamento de pele: excelente / 8
Forma dos tubérculos: oval / O
Regularidade da forma: regular / 7
Tuberização: alta / 8
Calibre dos tubérculos: médio a grande / 7
Regularidade do calibre: bastante regular / 6
Dormência: curta / 4

Sensibilidade e qualidade

Segundos crescimentos: moderadamente sensível / 6
Manchas negras: ligeiramente sensível a não sensível / 8
Rachamentos: moderadamente sensível / 6
Danos mecânicos: ligeiramente sensível / 7
Metribuzina: moderadamente sensível / 6
Metribuzina: moderadamente sensível / 6
Etileno: 5% menos a 5% mais tubérculos / 5
Peso debaixo de água: 316
Teor de matéria seca: 17,6%
Grupo culinário: moderadamente firme / AB
Descoloração após cozedura: moderadamente sensível / 6
Descoloração em cru: moderadamente sensível / 6,5
Qualidade para fritura em palitos: inadequada / 4
Distribuição da matéria seca: - / -
Qualidade para fritura em rodelas: inadequada / 4
Nível TGA: 8 mg/100g

A Agrico tomou todos os cuidados na elaboração da descrição desta variedade. No entanto, toda a informação pode estar sujeita a alterações e a Agrico não se responsabiliza por erros ou omissões. A Agrico não se responsabiliza por danos relacionados com as informações contidas nesta descrição.

AGRICO

RECOMENDAÇÃO DE CULTIVO

Conselhos de cultivo

www.agricopotatoes.pt

Preparacão da plantacão [1]

Azoto: conselho padrão + 20%.Dividir a fertilização, fazendo a segunda aplicação pouco depois da tuberização.

Fósforo: conselho padrão.

Potássio: conselho padrão.

Tratamento da semente

Adequado pré-abrolhamento, após retirada do brolho principal, pode ter um impacto positivo na obtenção de um bom número de tubérculos.Desgrelar mais que uma vez pode ter um efeito negativo no rendimento e na regularidade do calibre.

Distância de plantação

28/35 mm: 20 cm (67.000 plantas/ha)

35/50 mm: 27 cm (50.000 plantas/ha)

[1] O nível de fertilização é baseado na análise de solo.

Ervas daninhas

Após a emergência, uma utilização padrão de metribuzina pode provocar reações na folhagem e alguma perda de rendimento.

Fungicidas

É necessário fazer um apertado calendário de tratamentos contra o míldio.

Colheita

Devido à sua sensibilidade a manchas negras e danos mecânicos, esperar pelo menos 2 semanas para colher, após a aplicação do dessecante.

Temperatura de armazenamento - Tempo de armazenamento

A temperatura preferencial de armazenamento é de 4ºC. Adequada para períodos longos de armazenamento.



Say potato, say Agrico.

Resistências

Vírus do enrolamento: ligeiramente suscetível / 6

Vírus Yn: ligeiramente suscetível / 7

Vírus - Yntn (tubérculo): ligeiramente suscetível a não suscetível / 8

TRV: ligeiramente suscetível / 6,5

Míldio da folha: suscetível / 5

Míldio do tubérculo: ligeiramente suscetível / 6

Fusarium: suscetível / 5

Sarna comum: suscetível / 5

Sarna pulverulenta: ligeiramente suscetível / 6

Antracnose: ligeiramente suscetível / 6,5

Verruga negra F1: resistente / 10

Verruga negra F6: - / -

Verruga negra F18: - / -

Nemátode dourado Ro 1/4: resistente / 9

Nemátode dourado Ro 2/3: - / -

Nemátode, Globodera pallida Pa 2: - / -

Nemátode, Globodera pallida Pa 3: - / -

Agrico • Duit 15 • 8305 BB Emmeloord • Holanda +31 (0)527 63 99 11 info@agrico.nl www.agricopotatoes.pt