RECOMENDAÇÃO DE CULTIVO

Babylon.

Variedade para a indústria, tardia, de polpa amarela, bom rendimento e qualidade muito estável.

Indústria
Palitos
4ª Gama

Retalho
Fresco

Tradicional

- **Descarregar a recomendação de cultivo**
- **Elevado rendimento**
- **Excelente qualidade de fritura**
- **Boa conservação**
- **Forte resistência a vírus**



Características

Características

Obtentor: R.K. Bakker
Cruzamento: AGRIA MUTANT
Direito do obtentor: 31-12-2046
Clone: BA 06-0001

Características da planta e dos tubérculos

Maturação: tardia / 5
Brolho de cor clara: violeta azul / BV
Cor da flor: branca / W
Número de bagas: nenhuma / 8
Folhagem - desenvolvimento inicial: bastante rápido / 7
Folhagem - desenvolvimento final: bom / 8
Firmeza da folhagem: firme / 8
Cor da pele: amarela / Y
Cor da polpa: amarela / 7
Acabamento de pele: média / 6
Forma dos tubérculos: oval alongada / OL
Regularidade da forma: regular / 7
Tuberização: média / 6
Calibre dos tubérculos: grande / 8
Regularidade do calibre: regular / 7
Dormência: longa / 8

Sensibilidade e qualidade

Segundos crescimentos: moderadamente sensível / 6
Manchas negras: moderadamente sensível / 6
Rachamentos: moderadamente sensível / 6
Danos mecânicos: sensível / 5,5
Metribuzina: ligeiramente sensível / 7,5
Metribuzina: ligeiramente sensível / 7,5
Etileno: 5% menos a 5% mais tubérculos / 5
Peso debaixo de água: 401
Teor de matéria seca: 21,7%
Grupo culinário: farinhenta / BC
Descoloração após cozedura: ligeiramente sensível / 7
Descoloração em cru: ligeiramente sensível / 7
Qualidade para fritura em palitos: excelente / 8
Distribuição da matéria seca: boa / 7
Qualidade para fritura em rodelas: boa / 7
Nível TGA: 5,2 mg/100g

A Agrico tomou todos os cuidados na elaboração da descrição desta variedade. No entanto, toda a informação pode estar sujeita a alterações e a Agrico não se responsabiliza por erros ou omissões. A Agrico não se responsabiliza por danos relacionados com as informações contidas nesta descrição.

AGRICO

RECOMENDAÇÃO DE CULTIVO

Conselhos de cultivo

www.agricopotatoes.pt

Preparacão da plantacão [1]

Azoto: conselho padrão - 10%.
Fósforo: conselho padrão.
Potássio: conselho padrão + 10%.

Tratamento da semente

Adequado pré-abrolhamento, após retirada do brolho principal, pode ter um impacto positivo na obtenção de um bom número de tubérculos.Desgrelar uma vez é opcional.

Distância de plantação

28/35 mm: 25 cm (54.000 plantas/ha)
35/55 mm: 30 cm (44.000 plantas/ha)
50/55 mm: 35 cm (38.000 plantas/ha)

[1] O nível de fertilização é baseado na análise de solo.

Ervas daninhas

Após a emergência, uma utilização padrão de metribuzina pode provocar reações na folhagem e alguma perda de rendimento.

Fungicidas

É aconselhável fazer um calendário de tratamentos preventivos contra o míldio.

Colheita

Devido à sua sensibilidade a manchas negras e danos mecânicos, esperar pelo menos 3 semanas para colher, após a aplicação do dessecante.

Temperatura de armazenamento - Tempo de armazenamento

A temperatura preferencial de armazenamento é de 5ºC. Para fins industriais não armazenar a temperatura inferior a 7 ºC. Adequada para períodos longos de armazenamento.



Say potato, say Agrico.

Resistências

Vírus do enrolamento: - / -
Vírus Yn: ligeiramente suscetível / 7,5
Vírus - Yntn (tubérculo): ligeiramente suscetível / 7
TRV: ligeiramente suscetível / 6,5
Míldio da folha: suscetível / 5,5
Míldio do tubérculo: ligeiramente suscetível / 6,5
Fusarium: ligeiramente suscetível / 7
Sarna comum: suscetível / 5
Sarna pulverulenta: - / -
Antracnose: muito suscetível / 4,5
Verruga negra F1: resistente / 10
Verruga negra F6: - / -
Verruga negra F18: - / -
Nemátode dourado Ro 1/4: resistente em campo / 8
Nemátode dourado Ro 2/3: - / -
Nemátode, Globodera pallida Pa 2: - / -
Nemátode, Globodera pallida Pa 3: - / -

Agrico • Duit 15 • 8305 BB Emmeloord • Holanda +31 (0)527 63 99 11 info@agrico.nl www.agricopotatoes.pt