RECOMENDAÇÃO DE CULTIVO

Cerisa.

Variedade precoce, para saladas, de pele vermelha, tubérculos de pequeno calibre e excelente sabor.

Retalho
Salada

- **Tuberização muito elevada**
- **Excelente sabor e propriedades culinárias**
- **Boa resistência a vírus**



Características

Características

Obtentor: Desmazières
Cruzamento: FRANCINE x LAURA
Direito do obtentor: 31-12-2041
Clone: DM 99-063-07

Características da planta e dos tubérculos

Maturação: precoce / 7,5
Brolho de cor clara: violeta vermelha / RV
Cor da flor: roxa clara / LP
Número de bagas: muito elevado / 4
Folhagem - desenvolvimento inicial: bastante rápido / 7
Folhagem - desenvolvimento final: médio / 7
Firmeza da folhagem: bastante frágil / 5,5
Cor da pele: vermelha / R
Cor da polpa: amarela / 7
Acabamento de pele: excelente / 8
Forma dos tubérculos: longa / L
Regularidade da forma: regular / 7
Tuberização: alta / 9
Calibre dos tubérculos: médio / 6
Regularidade do calibre: bastante regular / 6
Dormência: média / 6

Sensibilidade e qualidade

Segundos crescimentos: moderadamente sensível / 6,5
Manchas negras: ligeiramente sensível / 7
Rachamentos: sensível / 5
Danos mecânicos: ligeiramente sensível / 7
Metribuzina: sensível / 5
Metribuzina: sensível / 5
Etileno: - / -
Peso debaixo de água: 391
Teor de matéria seca: 21,3%
Grupo culinário: firme / A
Descoloração após cozedura: ligeiramente sensível / 7
Descoloração em cru: sensível / 5,5
Qualidade para fritura em palitos: inadequada / 5
Distribuição da matéria seca: excelente / 8
Qualidade para fritura em rodelas: inadequada / 4,5
Nível TGA: 5,5 mg/100g

A Agrico tomou todos os cuidados na elaboração da descrição desta variedade. No entanto, toda a informação pode estar sujeita a alterações e a Agrico não se responsabiliza por erros ou omissões. A Agrico não se responsabiliza por danos relacionados com as informações contidas nesta descrição.

AGRICO

RECOMENDAÇÃO DE CULTIVO

Conselhos de cultivo

www.agricopotatoes.pt

Preparacão da plantacão [1]

Azoto: conselho padrão - 10%.
Fósforo: conselho padrão.
Potássio: conselho padrão.

Tratamento da semente

Pode ser plantada imediatamente após retirada da câmara de frio, de preferência após curto choque térmico.Desgrelar mais que uma vez pode ter um efeito negativo no rendimento e na regularidade do calibre.

Distância de plantação

30/50 mm: 20 cm (67.000 plantas/ha)

[1] O nível de fertilização é baseado na análise de solo.

Ervas daninhas

Após a emergência não aplicar metribuzina, pois o seu uso provoca severa reação foliar e grande perda de rendimento.

Fungicidas

É necessário fazer um apertado calendário de tratamentos contra o míldio.

Colheita

Devido à sua sensibilidade a manchas negras e danos mecânicos, esperar pelo menos 2 semanas para colher, após a aplicação do dessecante.

Temperatura de armazenamento - Tempo de armazenamento

A temperatura preferencial de armazenamento é de 4ºC. Adequada para armazenamento de médio a longo prazo.



Say potato, say Agrico.

Resistências

Vírus do enrolamento: - / -
Vírus Yn: ligeiramente suscetível a não suscetível / 8
Vírus - Yntn (tubérculo): ligeiramente suscetível / 7
TRV: suscetível / 5
Míldio da folha: muito suscetível / 4
Míldio do tubérculo: ligeiramente suscetível / 7
Fusarium: ligeiramente suscetível / 6
Sarna comum: ligeiramente suscetível / 6
Sarna pulverulenta: ligeiramente suscetível / 6
Antracnose: ligeiramente suscetível / 7
Verruga negra F1: - / -
Verruga negra F6: - / -
Verruga negra F18: - / -
Nemátode dourado Ro 1/4: - / -
Nemátode dourado Ro 2/3: - / -
Nemátode, Globodera pallida Pa 2: - / -
Nemátode, Globodera pallida Pa 3: - / -

Agrico • Duit 15 • 8305 BB Emmeloord • Holanda +31 (0)527 63 99 11 info@agrico.nl www.agricopotatoes.pt