RECOMENDAÇÃO DE CULTIVO

Chateau.

Variedade precoce para salada, com um bom número de tubérculos e um teor de matéria seca muito bom.

- **Excelente qualidade da pele**
- **Registo oficial tipo "Chair Ferme" (polpa firme)**
- **Tuberização elevada**

Retalho
Salada



Características

Características

Obtentor: Agrico Research B.V.
Cruzamento: MA 98-0322 x AR 98-0341
Direito do obtentor: 31-12-2046
Clone: AR 05-1443

Características da planta e dos tubérculos

Maturação: precoce / 7,5
Brolho de cor clara: violeta azul / BV
Cor da flor: branca / W
Número de bagas: superior à média / 5,5
Folhagem - desenvolvimento inicial: bastante rápido / 7,5
Folhagem - desenvolvimento final: bom / 8
Firmeza da folhagem: bastante firme / 7
Cor da pele: amarela / Y
Cor da polpa: amarela clara / 6,5
Acabamento de pele: boa / 7
Forma dos tubérculos: longa oval / LO
Regularidade da forma: regular / 7
Tuberização: alta / 8
Calibre dos tubérculos: médio a grande / 7
Regularidade do calibre: regular / 7
Dormência: média / 6

Sensibilidade e qualidade

Segundos crescimentos: moderadamente sensível / 6,5
Manchas negras: ligeiramente sensível a não sensível / 8
Rachamentos: moderadamente sensível / 6,5
Danos mecânicos: sensível / 5
Metribuzina: ligeiramente sensível / 7
Metribuzina: sensível / 5
Etileno: 5% a 15% mais tubérculos / 6
Peso debaixo de água: 350
Teor de matéria seca: 19,2%
Grupo culinário: moderadamente firme / AB
Descoloração após cozedura: ligeiramente sensível / 7,5
Descoloração em cru: ligeiramente sensível / 7,5
Qualidade para fritura em palitos: inadequada / 4
Distribuição da matéria seca: - / -
Qualidade para fritura em rodelas: inadequada / 4
Nível TGA: 4,2 mg/100g

A Agrico tomou todos os cuidados na elaboração da descrição desta variedade. No entanto, toda a informação pode estar sujeita a alterações e a Agrico não se responsabiliza por erros ou omissões. A Agrico não se responsabiliza por danos relacionados com as informações contidas nesta descrição.

AGRICO

RECOMENDAÇÃO DE CULTIVO

Conselhos de cultivo

www.agricopotatoes.pt

Preparacão da plantacão [1]

Azoto: conselho padrão.
Fósforo: conselho padrão.
Potássio: conselho padrão + 20%.

Tratamento da semente

Pode ser plantada imediatamente após retirada da câmara de frio, de preferência após curto choque térmico.Desgrelar mais que uma vez pode ter um efeito negativo no rendimento e na regularidade do calibre.

Distância de plantação

30/40 mm: 23 cm (58.000 plantas/ha)
40/50 mm: 26 cm (51.500 plantas/ha)

[1] O nível de fertilização é baseado na análise de solo.

Ervas daninhas

Após a emergência, uma utilização padrão de metribuzina pode provocar reações na folhagem e alguma perda de rendimento.

Fungicidas

É necessário fazer um apertado calendário de tratamentos contra o míldio.

Colheita

Devido à sua sensibilidade a manchas negras e danos mecânicos, esperar pelo menos 2 semanas para colher, após a aplicação do dessecante.

Temperatura de armazenamento - Tempo de armazenamento

A temperatura preferencial de armazenamento é de 5ºC. Adequada para períodos médios de armazenamento.



Say potato, say Agrico.

Resistências

Vírus do enrolamento: - / -
Vírus Yn: ligeiramente suscetível / 7
Vírus - Yntn (tubérculo): ligeiramente suscetível / 6,5
TRV: suscetível / 5
Míldio da folha: muito suscetível / 4
Míldio do tubérculo: suscetível / 5,5
Fusarium: ligeiramente suscetível / 7
Sarna comum: suscetível / 5,5
Sarna pulverulenta: muito suscetível / 2
Antracnose: muito suscetível / 4,5
Verruga negra F1: moderadamente suscetível / 8
Verruga negra F6: - / -
Verruga negra F18: - / -
Nemátode dourado Ro 1/4: resistente / 9
Nemátode dourado Ro 2/3: - / -
Nemátode, Globodera pallida Pa 2: - / -
Nemátode, Globodera pallida Pa 3: - / -

Agrico • Duit 15 • 8305 BB Emmeloord • Holanda +31 (0)527 63 99 11 info@agrico.nl www.agricopotatoes.pt