RECOMENDAÇÃO DE CULTIVO

Corazon.

Variedade semiprecoce de pele vermelha e bom rendimento precoce.

Retalho Fresco

Tradicional

- **Ampla resistência**
- **Maturidade precoce/colheita precoce**
- **Pele vermelha atraente**



Características

Características

Obtentor: Lantmännen Seed B.V.
Cruzamento: EVOLUTION x MANITOU
Direito do obtentor: 31-12-2048
Clone: SW 07-1082

Características da planta e dos tubérculos

Maturação: semiprecoce / 7
Brolho de cor clara: vermelha / R
Cor da flor: roxa clara / LP
Número de bagas: muito elevado / 4
Folhagem - desenvolvimento inicial: bastante rápido / 7,5
Folhagem - desenvolvimento final: bom / 8
Firmeza da folhagem: bastante firme / 7
Cor da pele: vermelha / R
Cor da polpa: amarela clara / 6
Acabamento de pele: boa / 7
Forma dos tubérculos: oval alongada / OL
Regularidade da forma: regular / 7
Tuberização: média alta / 7
Calibre dos tubérculos: médio a grande / 7
Regularidade do calibre: bastante regular / 6
Dormência: média a curta / 5,5

Sensibilidade e qualidade

Segundos crescimentos: moderadamente sensível / 6
Manchas negras: ligeiramente sensível / 7,5
Rachamentos: ligeiramente sensível / 7
Danos mecânicos: ligeiramente sensível / 7
Metribuzina: ligeiramente sensível / 7
Metribuzina: muito sensível / 4
Etileno: 5% a 15% mais tubérculos / 6
Peso debaixo de água: 321
Teor de matéria seca: 17,8%
Grupo culinário: moderadamente firme / AB
Descoloração após cozedura: moderadamente sensível / 6
Descoloração em cru: - / -
Qualidade para fritura em palitos: inferior à média / 5,5
Distribuição da matéria seca: - / -
Qualidade para fritura em rodelas: inadequada / 4
Nível TGA: 10 mg/100g

A Agrico tomou todos os cuidados na elaboração da descrição desta variedade. No entanto, toda a informação pode estar sujeita a alterações e a Agrico não se responsabiliza por erros ou omissões. A Agrico não se responsabiliza por danos relacionados com as informações contidas nesta descrição.

AGRICO

RECOMENDAÇÃO DE CULTIVO

Conselhos de cultivo

www.agricopotatoes.pt

Preparacão da plantacão [1]

Azoto: conselho padrão + 10%.

Fósforo: conselho padrão.

Potássio: conselho padrão.

Tratamento da semente

Adequado pré-abrolhamento, após retirada do brolho principal, pode ter um impacto positivo na obtenção de um bom número de tubérculos.Desgrelar mais que uma vez pode ter um efeito negativo no rendimento e na regularidade do calibre.

Distância de plantação

28/35 mm: 27 cm (50.000 plantas/ha)

35/55 mm: 33 cm (40.000 plantas/ha)

[1] O nível de fertilização é baseado na análise de solo.

Ervas daninhas

Após a emergência, uma utilização padrão de metribuzina pode provocar reações na folhagem ou perda de rendimento, mas raramente perda de produção.

Fungicidas

É necessário fazer um apertado calendário de tratamentos contra o míldio.

Colheita

Devido à sua sensibilidade a manchas negras e danos mecânicos, esperar pelo menos 2 semanas para colher, após a aplicação do dessecante.

Temperatura de armazenamento - Tempo de armazenamento

A temperatura preferencial de armazenamento é de 4ºC. Adequada para armazenamento de médio a longo prazo.



Say potato, say Agrico.

Resistências

Vírus do enrolamento: - / -

Vírus Yn: suscetível / 5,5

Vírus - Yntn (tubérculo): ligeiramente suscetível a não suscetível / 8,5

TRV: suscetível / 5,5

Míldio da folha: muito suscetível / 4,5

Míldio do tubérculo: ligeiramente suscetível / 6,5

Fusarium: suscetível / 5,5

Sarna comum: ligeiramente suscetível / 6

Sarna pulverulenta: muito suscetível / 4,5

Antracnose: ligeiramente suscetível / 7,5

Verruga negra F1: resistente / 10

Verruga negra F6: ligeiramente suscetível / 9

Verruga negra F18: - / -

Nemátode dourado Ro 1/4: resistente / 9

Nemátode dourado Ro 2/3: resistente / 9

Nemátode, Globodera pallida Pa 2: - / -

Nemátode, Globodera pallida Pa 3: - / -

Agrico • Duit 15 • 8305 BB Emmeloord • Holanda +31 (0)527 63 99 11 info@agrico.nl www.agricopotatoes.pt