RECOMENDAÇÃO DE CULTIVO

Corsica.

Variedade semitardia para fritura em rodelas (chips), com um bom rendimento e um bom teor de matéria seca.

- **Excelente qualidade de fritura em rodelas (chips)**
- **Boa conservação**
- **Tubérculos de calibre uniforme**

Indústria
Rodelas



Características

Características

Obtentor: Agrico Research B.V.
Cruzamento: LADY CLAIR x ARG 96-0865
Direito do obtentor: 31-12-2046
Clone: AR 05-1887

Características da planta e dos tubérculos

Maturação: semitardia / 5,5
Brolho de cor clara: violeta vermelha / RV
Cor da flor: branca / W
Número de bagas: muito elevado / 4
Folhagem - desenvolvimento inicial: bastante rápido / 7
Folhagem - desenvolvimento final: bom / 8
Firmeza da folhagem: bastante firme / 7,5
Cor da pele: amarela / Y
Cor da polpa: amarela clara / 6,5
Acabamento de pele: inferior á média / 5,5
Forma dos tubérculos: redonda oval / RO
Regularidade da forma: regular / 7
Tuberização: média alta / 7
Calibre dos tubérculos: médio a grande / 7,5
Regularidade do calibre: regular / 7
Dormência: média a longa / 7

Sensibilidade e qualidade

Segundos crescimentos: moderadamente sensível / 6
Manchas negras: ligeiramente sensível / 7
Rachamentos: moderadamente sensível / 6,5
Danos mecânicos: moderadamente sensível / 6
Metribuzina: ligeiramente sensível / 7
Etileno: 15% a 25% mais tubérculos / 7
Peso debaixo de água: 441
Teor de matéria seca: 23,7%
Grupo culinário: farinhenta / C
Descoloração após cozedura: moderadamente sensível / 6
Descoloração em cru: sensível / 5
Qualidade para fritura em palitos: média / 6
Distribuição da matéria seca: média / 6,5
Qualidade para fritura em rodelas: excelente / 8
Nível TGA: 5,33 mg/100g

A Agrico tomou todos os cuidados na elaboração da descrição desta variedade. No entanto, toda a informação pode estar sujeita a alterações e a Agrico não se responsabiliza por erros ou omissões. A Agrico não se responsabiliza por danos relacionados com as informações contidas nesta descrição.

AGRICO

RECOMENDAÇÃO DE CULTIVO

Conselhos de cultivo

www.agricopotatoes.pt

Preparacão da plantacão [1]

Azoto: conselho padrão - 10%.
Fósforo: conselho padrão.
Potássio: conselho padrão.

Tratamento da semente

Recomenda-se fazer um curto choque térmico ou pré-abrolhamento.Adequado pré-abrolhamento, após retirada do brolho principal, pode ter um impacto positivo na obtenção de um bom número de tubérculos.Desgrelar uma vez é opcional.

Distância de plantação

28/35 mm: 25 cm (54.000 plantas/ha)
35/55 mm: 30 cm (45.000 plantas/ha)

[1] O nível de fertilização é baseado na análise de solo.

Ervas daninhas

Após a emergência, uma utilização padrão de metribuzina pode provocar reações na folhagem ou perda de rendimento, mas raramente perda de produção.

Fungicidas

É necessário fazer um apertado calendário de tratamentos contra o míldio.

Colheita

Devido à sua sensibilidade a manchas negras e danos mecânicos, esperar pelo menos 2 semanas para colher, após a aplicação do dessecante.

Temperatura de armazenamento - Tempo de armazenamento

Para fins industriais não armazenar a tempuratura inferior 9 ºC. Adequada para períodos longos de armazenamento



Say potato, say Agrico.

Resistências

Vírus do enrolamento: - / -
Vírus Yn: ligeiramente suscetível / 6
Vírus - Yntn (tubérculo): suscetível / 5,5
TRV: muito suscetível / 4
Míldio da folha: suscetível / 5,5
Míldio do tubérculo: ligeiramente suscetível / 6,5
Fusarium: ligeiramente suscetível / 7
Sarna comum: ligeiramente suscetível / 7
Sarna pulverulenta: muito suscetível / 4,5
Antracnose: suscetível / 5,5
Verruga negra F1: resistente / 10
Verruga negra F6: - / -
Verruga negra F18: - / -
Nemátode dourado Ro 1/4: resistente / 9
Nemátode dourado Ro 2/3: - / -
Nemátode, Globodera pallida Pa 2: - / -
Nemátode, Globodera pallida Pa 3: - / -

Agrico • Duit 15 • 8305 BB Emmeloord • Holanda +31 (0)527 63 99 11 info@agrico.nl www.agricopotatoes.pt