RECOMENDAÇÃO DE CULTIVO

Ditta.

Variedade versátil, semitardia para consumo e salada, adequada para cultivo convencional e biológico.

Biológico

Retalho
Fresco
Salada

- **Excelente qualidade de consumo**
- **Boa conservação**
- **Múltiplas resistências**



characteristics

Características

Obtentor: Nieder Österreichische Saatbaugenossenschaft

Cruzamento: BINTJE x QUARTA

Direito do obtentor: Expirado

Clone: SW 80-0540

Características da planta e dos tubérculos

Maturação: semitardia / 6

Brolho de cor clara: violeta azul / BV

Cor da flor: branca / W

Número de bagas: muito elevado / 4

Folhagem - desenvolvimento inicial: bastante rápido / 7,5

Folhagem - desenvolvimento final: bom / 8

Firmeza da folhagem: bastante firme / 7

Cor da pele: amarela / Y

Cor da polpa: amarela clara / 6,5

Acabamento de pele: boa / 7

Forma dos tubérculos: longa oval / LO

Regularidade da forma: regular / 7

Tuberização: média alta / 7

Calibre dos tubérculos: médio a grande / 7

Regularidade do calibre: bastante regular / 6,5

Dormência: média a longa / 7

Sensibilidade e qualidade

Segundos crescimentos: moderadamente sensível / 6

Manchas negras: ligeiramente sensível / 7

Rachamentos: moderadamente sensível / 6,5

Danos mecânicos: sensível / 5,5

Metribuzina: ligeiramente sensível / 7

Metribuzina: ligeiramente sensível / 7

Bentazona: moderadamente sensível / 6,5

Etileno: - / -

Peso debaixo de água: 369

Teor de matéria seca: 20,2%

Grupo culinário: firme / A

Descoloração após cozedura: moderadamente sensível / 6

Descoloração em cru: muito sensível / 4

Qualidade para fritura em palitos: inferior à média / 5,5

Distribuição da matéria seca: - / -

Qualidade para fritura em rodelas: inadequada / 4

Nível TGA: -

A Agrico tomou todos os cuidados na elaboração da descrição desta variedade. No entanto, toda a informação pode estar sujeita a alterações e a Agrico não se responsabiliza por erros ou omissões. A Agrico não se responsabiliza por danos relacionados com as informações contidas nesta descrição.

AGRICO

RECOMENDAÇÃO DE CULTIVO

How to grow

www.agricopotatoes.pt

Preparacão da plantacão [1]

Azoto: conselho padrão - 10%.
Fósforo: conselho padrão.
Potássio: conselho padrão.

Tratamento da semente

Pode ser plantada imediatamente após retirada da câmara de frio, de preferência após curto choque térmico.Desgrelar mais que uma vez pode ter um efeito negativo no rendimento e na regularidade do calibre.

Planting distance

28/35 mm: 22 cm (60.500 plantas/ha)
35/50 mm: 27 cm (50.000 plantas/ha)

[1] O nível de fertilização é baseado na análise de solo.

Ervas daninhas

Após a emergência, uma utilização padrão de metribuzina pode provocar reações na folhagem ou perda de rendimento, mas raramente perda de produção.

Fungicidas

É necessário fazer um apertado calendário de tratamentos contra o míldio.

Colheita

Devido à sua sensibilidade a manchas negras e danos mecânicos, esperar pelo menos 2 semanas para colher, após a aplicação do dessecante.

Temperatura de armazenamento - Tempo de armazenamento

A temperatura preferencial de armazenamento é de 5ºC. Adequada para períodos médios de armazenamento.

Say potato, say Agrico.

Resistências

Vírus do enrolamento: ligeiramente suscetível / 7
Vírus Yn: ligeiramente suscetível / 7,5
Vírus - Yntn (tubérculo): suscetível / 5
TRV: suscetível / 5
Míldio da folha: suscetível / 5,5
Míldio do tubérculo: ligeiramente suscetível / 7
Fusarium: ligeiramente suscetível / 6
Sarna comum: ligeiramente suscetível / 6
Sarna pulverulenta: ligeiramente suscetível / 6,5
Antracnose: ligeiramente suscetível / 6
Verruga negra F1: resistente / 10
Verruga negra F6: - / -
Verruga negra F18: - / -
Nemátode dourado Ro 1/4: resistente / 9
Nemátode dourado Ro 2/3: - / -
Nemátode, Globodera pallida Pa 2: - / -
Nemátode, Globodera pallida Pa 3: - / -

Agrico • Duit 15 • 8305 BB Emmeloord • Holanda +31 (0)527 63 99 11 info@agrico.nl www.agricopotatoes.pt