RECOMENDAÇÃO DE CULTIVO

Lugano.

Variedade de indústria, semitardia, de polpa amarela e boa resistência aos nematodes dos quistos da batateira e verruga negra.

Indústria
Palitos

Tradicional



- **Tubérculos grandes**
- **Múltiplas resistências**
- **Boa conservação**
- **Excelente qualidade de fritura**
- **Forte dormência**

Características

Características

Obtentor: F.J. Vos
Cruzamento: AR 00-2211 x AR 99-0669
Direito do obtentor: 31-12-2048
Clone: VO 07-0289

Características da planta e dos tubérculos

Maturação: semitardia / 5,5
Brolho de cor clara: vermelha / R
Cor da flor: branca / W
Número de bagas: inferior à média / 7
Folhagem - desenvolvimento inicial: bastante rápido / 7
Folhagem - desenvolvimento final: bom / 8
Firmeza da folhagem: bastante firme / 7,5
Cor da pele: amarela / Y
Cor da polpa: amarela clara / 6,5
Acabamento de pele: média / 6
Forma dos tubérculos: oval alongada / OL
Regularidade da forma: bastante regular / 6
Tuberização: baixa a média / 5
Calibre dos tubérculos: grande / 8
Regularidade do calibre: regular / 7
Dormência: longa / 8

Sensibilidade e qualidade

Segundos crescimentos: moderadamente sensível / 6
Manchas negras: moderadamente sensível / 6
Rachamentos: moderadamente sensível / 6,5
Danos mecânicos: muito sensível / 4,5
Metribuzina: ligeiramente sensível a não sensível / 8
Metribuzina: ligeiramente sensível / 7,5
Etileno: 5% a 15% mais tubérculos / 6
Peso debaixo de água: 394
Teor de matéria seca: 21,4%
Grupo culinário: moderadamente farinhenta / B
Descoloração após cozedura: moderadamente sensível / 6,5
Descoloração em cru: moderadamente sensível / 6
Qualidade para fritura em palitos: excelente / 8
Distribuição da matéria seca: boa / 7,5
Qualidade para fritura em rodelas: inferior à média / 5,5
Nível TGA: 6,4 mg/100g

A Agrico tomou todos os cuidados na elaboração da descrição desta variedade. No entanto, toda a informação pode estar sujeita a alterações e a Agrico não se responsabiliza por erros ou omissões. A Agrico não se responsabiliza por danos relacionados com as informações contidas nesta descrição.

AGRICO

RECOMENDAÇÃO DE CULTIVO

Conselhos de cultivo

www.agricopotatoes.pt

Preparacão da plantacão [1]

Azoto: conselho padrão.
Fósforo: conselho padrão.
Potássio: conselho padrão + 20%.

Tratamento da semente

Adequado pré-abrolhamento, após retirada do brolho principal, pode ter um impacto positivo na obtenção de um bom número de tubérculos.

Distância de plantação

28/35 mm: 22 cm (60.000 plantas/ha)
35/55 mm: 30 cm (45.000 plantas/ha)
50/55 mm: 36 cm (37.000 plantas/ha)

[1] O nível de fertilização é baseado na análise de solo.

Ervas daninhas

Após a emergência, uma utilização padrão de metribuzina não provoca reações na folhagem ou perda de rendimento.

Fungicidas

É aconselhável fazer um calendário de tratamentos preventivos contra o míldio.

Colheita

Devido à sua sensibilidade a manchas negras e danos mecânicos, esperar pelo menos 3 semanas para colher, após a aplicação do dessecante.

Temperatura de armazenamento - Tempo de armazenamento

A temperatura preferencial de armazenamento é de 5ºC. Para fins industriais não armazenar a temperatura inferior a 7 ºC. Adequada para períodos longos de armazenamento.



Say potato, say Agrico.

Resistências

Vírus do enrolamento: - / -
Vírus Yn: suscetível / 5,5
Vírus - Yntn (tubérculo): ligeiramente suscetível / 7,5
TRV: suscetível / 5,5
Míldio da folha: suscetível / 5
Míldio do tubérculo: suscetível / 5,5
Fusarium: suscetível / 5,5
Sarna comum: suscetível / 5,5
Sarna pulverulenta: ligeiramente suscetível / 7,5
Antracnose: ligeiramente suscetível / 6
Verruga negra F1: resistente / 10
Verruga negra F6: ligeiramente suscetível / 9
Verruga negra F18: - / -
Nemátode dourado Ro 1/4: resistente / 9
Nemátode dourado Ro 2/3: resistente / 9
Nemátode, Globodera pallida Pa 2: resistente / 9
Nemátode, Globodera pallida Pa 3: resistente / 9

Agrico • Duit 15 • 8305 BB Emmeloord • Holanda +31 (0)527 63 99 11 info@agrico.nl www.agricopotatoes.pt