

Melrose.

Variedade multiusos, semitardia, com um sabor intenso.




Indústria
4ª Gama



Retalho
Fresco
Especialidades

- ▶ **Polpa bastante farinhenta após cozedura**
- ▶ **Polpa amarela**
- ▶ **Pele vermelha clara**



CARACTERÍSTICAS

Características

Obtento: C.R.A.

Cruzamento: BP 15.7.70 x AM 15.1.68

Direito do obtento: 31-12-2042

Clone: ISCI 12/01-5

Características da planta e dos tubérculos

Maturação: semitardia / 6

Brolho de cor clara: - / -

Cor da flor: branca / W

Número de bagas: - / -

Folhagem - desenvolvimento inicial: médio / 6,5

Folhagem - desenvolvimento final: bastante bom / 7,5

Firmeza da folhagem: bastante firme / 7

Cor da pele: vermelha / R

Cor da polpa: amarela / 7

Acabamento de pele: superior á média / 6,5

Forma dos tubérculos: oval / O

Regularidade da forma: regular / 7

Tuberização: alta / 8

Calibre dos tubérculos: médio a grande / 7

Regularidade do calibre: bastante regular / 6

Dormência: média / 6

Sensibilidade e qualidade

Segundos crescimentos: ligeiramente sensível / 7

Manchas negras: moderadamente sensível / 6

Rachamentos: ligeiramente sensível / 7

Danos mecânicos: ligeiramente sensível / 7

Metribuzina: ligeiramente sensível / 7,5

Metribuzina: ligeiramente sensível / 7,5

Etileno: - / -

Peso debaixo de água: 406

Teor de matéria seca: 22%

Grupo culinário: moderadamente farinhenta / B

Descoloração após cozedura: moderadamente sensível / 6,5

Descoloração em cru: muito sensível / 4,5

Qualidade para fritura em palitos: superior à média / 6,5

Distribuição da matéria seca: - / -

Qualidade para fritura em rodela: inadequada / 5

Nível TGA: 9,5

CONSELHOS DE CULTIVO



www.agricopotatoes.pt

Preparação da plantação ¹

Azoto: conselho padrão.

Fósforo: conselho padrão.

Potássio: conselho padrão + 10%.

Tratamento da semente

Recomenda-se fazer um curto choque térmico ou pré-abrolhamento. Desgrelar mais que uma vez pode ter um efeito negativo no rendimento e na regularidade do calibre.

Distância de plantação

28/35 mm: 20 cm (67.000 plantas/ha)

35/50 mm: 25 cm (54.000 plantas/ha)

¹ O nível de fertilização é baseado na análise de solo.

Ervas daninhas

Após a emergência, uma utilização padrão de metribuzina não provoca reações na folhagem ou perda de rendimento.

Fungicidas

É necessário fazer um apertado calendário de tratamentos contra o míldio.

Colheita

Devido à sua sensibilidade a manchas negras e danos mecânicos, esperar pelo menos 2 semanas para colher, após a aplicação do dessecante.

Temperatura de armazenamento - Tempo de armazenamento

A temperatura preferencial de armazenamento é de 5°C. Adequada para períodos médios de armazenamento.



Resistências

Vírus do enrolamento: - / -

Vírus Yn: ligeiramente suscetível a não suscetível / 8

Vírus - Yntn (tubérculo): ligeiramente suscetível a não suscetível / 8

TRV: - / -

Míldio da folha: muito suscetível / 4

Míldio do tubérculo: - / -

Fusarium: - / -

Sarna comum: ligeiramente suscetível / 6

Sarna pulverulenta: - / -

Antracnose: - / -

Verruga negra F1: moderadamente suscetível / 7

Verruga negra F6: - / -

Verruga negra F18: - / -

Nemátode dourado Ro 1/4: - / -

Nemátode dourado Ro 2/3: - / -

Nemátode, Globodera pallida Pa 2: - / -

Nemátode, Globodera pallida Pa 3: - / -

Say potato,
say Agrico.