RECOMENDAÇÃO DE CULTIVO

Meryem.

Variedade tardia, de elevado rendimento com uma bonita pele vermelha.

Tradicional

- **Bonita pele vermelha**
- **Elevado rendimento**
- **Tubérculos de calibre uniforme**
- **Folhas firmes**
- **Tubérculos grandes**



Características

Características

Obtentor: Agrico Research B.V.
Cruzamento: LUSA x AR 01-0420
Direito do obtentor: 31-12-2049
Clone: AR 08-4009

Características da planta e dos tubérculos

Maturação: tardia / 5
Brolho de cor clara: violeta vermelha / RV
Cor da flor: roxa clara / LP
Número de bagas: inferior à média / 6,5
Folhagem - desenvolvimento inicial: rápido / 8
Folhagem - desenvolvimento final: bom / 8
Firmeza da folhagem: bastante firme / 7,5
Cor da pele: vermelha / R
Cor da polpa: amarela clara / 6,5
Acabamento de pele: muito boa / 7,5
Forma dos tubérculos: longa oval / LO
Regularidade da forma: bastante regular / 6,5
Tuberização: média alta / 7
Calibre dos tubérculos: médio a grande / 7,5
Regularidade do calibre: bastante regular / 6,5
Dormência: curta / 4

Sensibilidade e qualidade

Segundos crescimentos: moderadamente sensível / 6,5
Manchas negras: ligeiramente sensível / 7
Rachamentos: ligeiramente sensível / 7
Danos mecânicos: moderadamente sensível / 6
Metribuzina: moderadamente sensível / 6,5
Metribuzina: ligeiramente sensível / 7,5
Etileno: 5% a 15% mais tubérculos / 6
Peso debaixo de água: 349
Teor de matéria seca: 19,2%
Grupo culinário: moderadamente farinhenta / B
Descoloração após cozedura: moderadamente sensível / 6,5
Descoloração em cru: - / -
Qualidade para fritura em palitos: inferior à média / 5,5
Distribuição da matéria seca: - / -
Qualidade para fritura em rodelas: inadequada / 4
Nível TGA: 3,3 mg/100g

A Agrico tomou todos os cuidados na elaboração da descrição desta variedade. No entanto, toda a informação pode estar sujeita a alterações e a Agrico não se responsabiliza por erros ou omissões. A Agrico não se responsabiliza por danos relacionados com as informações contidas nesta descrição.

AGRICO

RECOMENDAÇÃO DE CULTIVO

Conselhos de cultivo

www.agricopotatoes.pt

Preparacão da plantacão [1]

Azoto: conselho padrão.

Fósforo: conselho padrão.

Potássio: conselho padrão + 20%.

Tratamento da semente

Pode ser plantada imediatamente após retirada da câmara de frio, de preferência após curto choque térmico.Desgrelar mais que uma vez pode ter um efeito negativo no rendimento e na regularidade do calibre.

Distância de plantação

28/35 mm: 25 cm (54.000 plantas/ha)

35/55 mm: 35 cm (38.000 plantas/ha)

[1] O nível de fertilização é baseado na análise de solo.

Ervas daninhas

Após a emergência, uma utilização padrão de metribuzina não provoca reações na folhagem ou perda de rendimento.

Fungicidas

É necessário fazer um apertado calendário de tratamentos contra o míldio.

Colheita

Devido à sua sensibilidade a manchas negras e danos mecânicos, esperar pelo menos 2 semanas para colher, após a aplicação do dessecante.

Temperatura de armazenamento - Tempo de armazenamento

A temperatura preferencial de armazenamento é de 5ºC. Adequada para armazenamento de curto a médio de prazo.



Say potato, say Agrico.

Resistências

Vírus do enrolamento: - / -

Vírus Yn: ligeiramente suscetível / 6,5

Vírus - Yntn (tubérculo): ligeiramente suscetível / 7,5

TRV: ligeiramente suscetível a não suscetível / 9

Míldio da folha: muito suscetível / 4,5

Míldio do tubérculo: ligeiramente suscetível / 6

Fusarium: suscetível / 5

Sarna comum: suscetível / 5,5

Sarna pulverulenta: ligeiramente suscetível / 6

Antracnose: ligeiramente suscetível a não suscetível / 8

Verruga negra F1: resistente / 10

Verruga negra F6: ligeiramente suscetível / 9

Verruga negra F18: - / -

Nemátode dourado Ro 1/4: - / -

Nemátode dourado Ro 2/3: - / -

Nemátode, Globodera pallida Pa 2: - / -

Nemátode, Globodera pallida Pa 3: - / -

Agrico • Duit 15 • 8305 BB Emmeloord • Holanda +31 (0)527 63 99 11 info@agrico.nl www.agricopotatoes.pt