RECOMENDAÇÃO DE CULTIVO

Milva.

Variedade semitardia com uma boa resistência à sarna comum e rendimento muito elevado.

- **Polpa bastante farinhenta após cozedura**
- **Tubérculos grandes**
- **Tuberização elevada**

Retalho
Fresco



Características

Características

Obtentor: Saatzucht Berding
Cruzamento: NENA x DUNJA
Direito do obtentor: 31-12-2028
Clone: NKG 86-1158

Características da planta e dos tubérculos

Maturação: tardia / 5
Brolho de cor clara: violeta azul / BV
Cor da flor: branca / W
Número de bagas: muito elevado / 4
Folhagem - desenvolvimento inicial: bastante rápido / 7
Folhagem - desenvolvimento final: bom / 8
Firmeza da folhagem: bastante firme / 7
Cor da pele: amarela / Y
Cor da polpa: amarela / 7
Acabamento de pele: boa / 7
Forma dos tubérculos: oval / O
Regularidade da forma: bastante irregular / 5
Tuberização: alta / 8
Calibre dos tubérculos: médio a grande / 7,5
Regularidade do calibre: bastante regular / 6,5
Dormência: média / 6

Sensibilidade e qualidade

Segundos crescimentos: moderadamente sensível / 6
Manchas negras: ligeiramente sensível / 7
Rachamentos: moderadamente sensível / 6
Danos mecânicos: sensível / 5
Metribuzina: ligeiramente sensível a não sensível / 8
Metribuzina: ligeiramente sensível a não sensível / 8
Etileno: - / -
Peso debaixo de água: 380
Teor de matéria seca: 20,7%
Grupo culinário: moderadamente farinhenta / B
Descoloração após cozedura: moderadamente sensível / 6,5
Descoloração em cru: moderadamente sensível / 6,5
Qualidade para fritura em palitos: inadequada / 4
Distribuição da matéria seca: - / -
Qualidade para fritura em rodelas: inadequada / 4
Nível TGA: 2,4 mg/100g

A Agrico tomou todos os cuidados na elaboração da descrição desta variedade. No entanto, toda a informação pode estar sujeita a alterações e a Agrico não se responsabiliza por erros ou omissões. A Agrico não se responsabiliza por danos relacionados com as informações contidas nesta descrição.

AGRICO

RECOMENDAÇÃO DE CULTIVO

Conselhos de cultivo

www.agricopotatoes.pt

Preparacão da plantacão [1]

Azoto: conselho padrão + 10%.
Fósforo: conselho padrão.
Potássio: conselho padrão.

Tratamento da semente

Adequado pré-abrolhamento, após retirada do brolho principal, pode ter um impacto positivo na obtenção de um bom número de tubérculos.Desgrelar mais que uma vez pode ter um efeito negativo no rendimento e na regularidade do calibre.

Distância de plantação

28/35 mm: 20 cm (67.000 plantas/ha)
35/50 mm: 25 cm (54.000 plantas/ha)

[1] O nível de fertilização é baseado na análise de solo.

Ervas daninhas

Após a emergência, uma utilização padrão de metribuzina não provoca reações na folhagem ou perda de rendimento.

Fungicidas

É necessário fazer um apertado calendário de tratamentos contra o míldio.

Colheita

Devido à sua sensibilidade a manchas negras e danos mecânicos, esperar pelo menos 2 semanas para colher, após a aplicação do dessecante.

Temperatura de armazenamento - Tempo de armazenamento

A temperatura preferencial de armazenamento é de 5ºC. Adequada para períodos médios de armazenamento.



Say potato, say Agrico.

Resistências

Vírus do enrolamento: ligeiramente suscetível / 7
Vírus Yn: ligeiramente suscetível / 6
Vírus - Yntn (tubérculo): ligeiramente suscetível / 6
TRV: suscetível / 5
Míldio da folha: muito suscetível / 4,5
Míldio do tubérculo: ligeiramente suscetível / 6
Fusarium: suscetível / 5
Sarna comum: ligeiramente suscetível / 7
Sarna pulverulenta: ligeiramente suscetível / 6
Antracnose: - / -
Verruga negra F1: - / -
Verruga negra F6: - / -
Verruga negra F18: - / -
Nemátode dourado Ro 1/4: resistente / 9
Nemátode dourado Ro 2/3: - / -
Nemátode, Globodera pallida Pa 2: - / -
Nemátode, Globodera pallida Pa 3: - / -

Agrico • Duit 15 • 8305 BB Emmeloord • Holanda +31 (0)527 63 99 11 info@agrico.nl www.agricopotatoes.pt