

Nofy.

Variedade tardia para fécula, com bom rendimento e resistente ao míldio da folha e do tubérculo.



Biológico



Indústria
Fécula

Image:

- » **Elevado teor de matéria seca**
- » **Boa conservação**
- » **Boa resistência a vírus**

Características

Características

Obtentor: AKV Langholt

Cruzamento: STAYER x AR 02-3921

Direito do obtentor: 31-12-2048

Clone: PL 08-4007

Características da planta e dos tubérculos

Maturação: tardia / 5

Brolho de cor clara: vermelha verde / GR

Cor da flor: branca / W

Número de bagas: inferior à média / 7

Folhagem - desenvolvimento inicial: bastante rápido / 7,5

Folhagem - desenvolvimento final: bom / 8

Firmeza da folhagem: bastante firme / 7,5

Cor da pele: amarela / Y

Cor da polpa: amarela clara / 6,5

Acabamento de pele: bastante fraca / 5

Forma dos tubérculos: oval redonda / OR

Regularidade da forma: bastante regular / 6,5

Tuberização: média alta / 7

Calibre dos tubérculos: médio a grande / 7,5

Regularidade do calibre: bastante regular / 6,5

Dormência: média a longa / 7,5

Sensibilidade e qualidade

Segundos crescimentos: moderadamente sensível / 6,5

Manchas negras: moderadamente sensível / 6

Rachamentos: ligeiramente sensível a não sensível / 8

Danos mecânicos: moderadamente sensível / 6

Metribuzina: ligeiramente sensível a não sensível / 8

Metribuzina: ligeiramente sensível a não sensível / 8

Etileno: 15% a 25% mais tubérculos / 7

Peso debaixo de água: 471

Teor de matéria seca: 25,2%

Grupo culinário: farinhenta / BC

Descoloração após cozedura: moderadamente sensível / 6,5

Descoloração em cru: - / -

Qualidade para fritura em palitos: inadequada / 4

Distribuição da matéria seca: - / -

Qualidade para fritura em rodela: inadequada / 4,5

Nível TGA: 15,37 mg/100g

S_Harvestability: sensível / 5,5

Conselhos de cultivo



www.agricopotatoes.pt

Preparação da plantação ¹

Azoto: conselho padrão + 10%. É possível o uso de estrume.

Fósforo: conselho padrão.

Potássio: conselho padrão + 10%.

Tratamento da semente

Pode ser plantada imediatamente após retirada da câmara de frio, de preferência após curto choque térmico. Desgrelar mais que uma vez pode ter um efeito negativo no rendimento e na regularidade do calibre.

Distância de plantação

28/35 mm: 23 cm (58.000 plantas/ha)

35/55 mm: 27 cm (49.000 plantas/ha)

¹ O nível de fertilização é baseado na análise de solo.

Ervas daninhas

Após a emergência, uma utilização padrão de metribuzina não provoca reações na folhagem ou perda de rendimento.

Fungicidas

Apesar da resistência ao míldio, deve estar-se alerta a possíveis infeções.

Colheita

Devido à sua sensibilidade a manchas negras e danos mecânicos, esperar pelo menos 2 semanas para colher, após a aplicação do dessecante.

Temperatura de armazenamento - Tempo de armazenamento

A temperatura preferencial de armazenamento é de 5°C. Adequada para períodos longos de armazenamento.

Image:

Say potato,
say Agrico.

Resistências

Vírus do enrolamento: - / -

Vírus Yn: ligeiramente suscetível / 6,5

Vírus - Yntn (tubérculo): ligeiramente suscetível a não suscetível / 9

TRV: muito suscetível / 4,5

Míldio da folha: ligeiramente suscetível a não suscetível / 9

Míldio do tubérculo: ligeiramente suscetível a não suscetível / 8,5

Fusarium: - / -

Sarna comum: ligeiramente suscetível / 6

Sarna pulverulenta: muito suscetível / 4,5

Antracnose: ligeiramente suscetível a não suscetível / 8

R_PCN Tolerance: - / -

Verruga negra F1: - / -

Verruga negra F6: - / -

Verruga negra F18: - / -

Nemátode dourado Ro 1/4: resistente / 9

Nemátode dourado Ro 2/3: moderadamente suscetível / 6

Nemátode, Globodera pallida Pa 2: moderadamente suscetível / 5

Nemátode, Globodera pallida Pa 3: suscetível / 2