RECOMENDAÇÃO DE CULTIVO

Ranomi.

Variedade precoce com resistência relativamente boa à sarna comum e bom rendimento.

- **Bonito acabamento de pele**
- **Tubérculos grandes**
- **Polpa bastante firme após cozedura**

Retalho
Fresco

Tradicional



Características

Características

Obtentor: Agrico Research B.V.

Cruzamento: AR 93-033-79 x AR 95-0319

Direito do obtentor: 31-12-2044

Clone: AR 03-0221

Características da planta e dos tubérculos

Maturação: precoce / 7,5

Brolho de cor clara: violeta vermelha / RV

Cor da flor: branca / W

Número de bagas: médio / 6

Folhagem - desenvolvimento inicial: bastante rápido / 7,5

Folhagem - desenvolvimento final: médio / 7

Firmeza da folhagem: média / 6,5

Cor da pele: amarela / Y

Cor da polpa: amarela clara / 6,5

Acabamento de pele: boa / 7

Forma dos tubérculos: oval alongada / OL

Regularidade da forma: regular / 7

Tuberização: média / 6

Calibre dos tubérculos: médio a grande / 7

Regularidade do calibre: regular / 7

Dormência: média / 6

Sensibilidade e qualidade

Segundos crescimentos: moderadamente sensível / 6

Manchas negras: ligeiramente sensível a não sensível / 8

Rachamentos: moderadamente sensível / 6,5

Danos mecânicos: moderadamente sensível / 6

Metribuzina: sensível / 5

Metribuzina: moderadamente sensível / 6

Etileno: 5% a 15% mais tubérculos / 6

Peso debaixo de água: 322

Teor de matéria seca: 17,9%

Grupo culinário: moderadamente firme / AB

Descoloração após cozedura: moderadamente sensível / 6

Descoloração em cru: - / -

Qualidade para fritura em palitos: superior à média / 6,5

Distribuição da matéria seca: - / -

Qualidade para fritura em rodelas: inadequada / 5

Nível TGA: 4,08 mg/100g

A Agrico tomou todos os cuidados na elaboração da descrição desta variedade. No entanto, toda a informação pode estar sujeita a alterações e a Agrico não se responsabiliza por erros ou omissões. A Agrico não se responsabiliza por danos relacionados com as informações contidas nesta descrição.

AGRICO

RECOMENDAÇÃO DE CULTIVO

Conselhos de cultivo

www.agricopotatoes.pt

Preparacão da plantacão [1]

Azoto: conselho padrão.Dividir a fertilização, fazendo a segunda aplicação pouco depois da tuberização.

Fósforo: conselho padrão.

Potássio: conselho padrão + 10%.

Tratamento da semente

Pode ser plantada imediatamente após retirada da câmara de frio, de preferência após curto choque térmico.Desgrelar mais que uma vez pode ter um efeito negativo no rendimento e na regularidade do calibre.

Distância de plantação

28/35 mm: 25 cm (54.000 plantas/ha)
35/55 mm: 30 cm (45.000 plantas/ha)

[1] O nível de fertilização é baseado na análise de solo.

Ervas daninhas

Após a emergência, uma utilização padrão de metribuzina pode provocar reações na folhagem e alguma perda de rendimento.

Fungicidas

É necessário fazer um apertado calendário de tratamentos contra o míldio.

Colheita

Devido à sua sensibilidade a manchas negras e danos mecânicos, esperar pelo menos 2 semanas para colher, após a aplicação do dessecante.

Temperatura de armazenamento - Tempo de armazenamento

A temperatura preferencial de armazenamento é de 4ºC. Adequada para expedição diretamente do campo ou curto armazenamento.



Say potato, say Agrico.

Resistências

Vírus do enrolamento: - / -
Vírus Yn: suscetível / 5,5
Vírus - Yntn (tubérculo): ligeiramente suscetível / 6
TRV: ligeiramente suscetível / 6,5
Míldio da folha: muito suscetível / 4
Míldio do tubérculo: ligeiramente suscetível / 6
Fusarium: suscetível / 5
Sarna comum: ligeiramente suscetível / 6,5
Sarna pulverulenta: muito suscetível / 4,5
Antracnose: ligeiramente suscetível / 7
Verruga negra F1: resistente / 10
Verruga negra F6: - / -
Verruga negra F18: - / -
Nemátode dourado Ro 1/4: resistente / 9
Nemátode dourado Ro 2/3: - / -
Nemátode, Globodera pallida Pa 2: - / -
Nemátode, Globodera pallida Pa 3: - / -

Agrico • Duit 15 • 8305 BB Emmeloord • Holanda +31 (0)527 63 99 11 info@agrico.nl www.agricopotatoes.pt