

Spectra.

Variedade semiprecoce de elevado rendimento, com tubérculos muito regulares em forma, de pele macia muito atrativa.


- ▶ **Tubérculos grandes**
- ▶ **Boa tuberização**
- ▶ **Tubérculos de calibre uniforme**



Retalho Fresco



Tradicional



characteristics

Características

Obtentor: Lantmännen Seed B.V.

Cruzamento: ARIELLE x SOFIA

Direito do obtentor: 31-12-2046

Clone: SW 05-1431

Características da planta e dos tubérculos

Maturação: semiprecoce / 7

Brolho de cor clara: violeta vermelha / RV

Cor da flor: branca / W

Número de bagas: muito elevado / 4

Folhagem - desenvolvimento inicial: rápido / 8

Folhagem - desenvolvimento final: bastante bom / 7,5

Firmeza da folhagem: média / 6,5

Cor da pele: amarela / Y

Cor da polpa: amarela clara / 6

Acabamento de pele: muito boa / 7,5

Forma dos tubérculos: oval redonda / OR

Regularidade da forma: regular / 7,5

Tuberização: média alta / 7

Calibre dos tubérculos: médio a grande / 7,5

Regularidade do calibre: bastante regular / 6,5

Dormência: média a curta / 5

Sensibilidade e qualidade

Segundos crescimentos: moderadamente sensível / 6,5

Manchas negras: ligeiramente sensível / 7,5

Rachamentos: moderadamente sensível / 6

Danos mecânicos: moderadamente sensível / 6

Metribuzina: ligeiramente sensível / 7

Metribuzina: ligeiramente sensível / 7,5

Bentazona: ligeiramente sensível a não sensível / 8

Etileno: 5% menos a 5% mais tubérculos / 5

Peso debaixo de água: 324

Teor de matéria seca: 17,9%

Grupo culinário: moderadamente firme / AB

Descoloração após cozedura: moderadamente sensível / 6

Descoloração em cru: muito sensível / 4

Qualidade para fritura em palitos: inadequada / 4,5

Distribuição da matéria seca: - / -

Qualidade para fritura em rodela: inadequada / 4

Nível TGA: 4,7

How to grow



www.agricopotatoes.pt

Preparação da plantação ¹

Azoto: conselho padrão.

Fósforo: conselho padrão.

Potássio: conselho padrão.

Tratamento da semente

Pode ser plantada imediatamente após retirada da câmara de frio, de preferência após curto choque térmico. Desgrelar pode ter um efeito negativo no rendimento e na regularidade do calibre.

Planting distance

28/35 mm: 27 cm (50.000 plantas/ha)

35/55 mm: 33 cm (40.000 plantas/ha)

Plante Spectra um pouco mais fundo que as outras variedades para evitar tubérculos verdes.

¹ O nível de fertilização é baseado na análise de solo.

Ervas daninhas

Após a emergência, uma utilização padrão de metribuzina pode provocar reações na folhagem e alguma perda de rendimento.

Fungicidas

É necessário fazer um apertado calendário de tratamentos contra o míldio.

Colheita

Devido à sua sensibilidade a manchas negras e danos mecânicos, esperar pelo menos 2 semanas para colher, após a aplicação do dessecante.

Temperatura de armazenamento - Tempo de armazenamento

A temperatura preferencial de armazenamento é de 4°C. Adequada para períodos médios de armazenamento.



Say potato,
say Agrico.

Resistências

Vírus do enrolamento: - / -

Vírus Yn: ligeiramente suscetível / 6

Vírus - Yntn (tubérculo): ligeiramente suscetível / 7

TRV: suscetível / 5

Míldio da folha: muito suscetível / 4,5

Míldio do tubérculo: ligeiramente suscetível / 6

Fusarium: suscetível / 5,5

Sarna comum: suscetível / 5

Sarna pulverulenta: muito suscetível / 4

Antracnose: suscetível / 5

Verruga negra F1: resistente / 10

Verruga negra F6: - / -

Verruga negra F18: - / -

Nemátode dourado Ro 1/4: resistente / 9

Nemátode dourado Ro 2/3: - / -

Nemátode, Globodera pallida Pa 2: - / -

Nemátode, Globodera pallida Pa 3: - / -