

# Spectra.

Variedade semiprecoce de elevado rendimento, com tubérculos muito regulares em forma, de pele macia muito atrativa.


- ▶ **Tubérculos grandes**
- ▶ **Boa tuberização**
- ▶ **Tubérculos de calibre uniforme**



**Retalho  
Fresco**



**Tradicional**



## characteristics

### Características

Obtentor: Lantmännen Seed B.V.  
Cruzamento: ARIELLE x SOFIA  
Direito do obtentor: 31-12-2046  
Clone: SW 05-1431

### Características da planta e dos tubérculos

Maturação: semiprecoce / 7  
Brolho de cor clara: violeta vermelha / RV  
Cor da flor: branca / W  
Número de bagas: muito elevado / 4  
Folhagem - desenvolvimento inicial: rápido / 8  
Folhagem - desenvolvimento final: bastante bom / 7,5  
Firmeza da folhagem: média / 6,5  
Cor da pele: amarela / Y  
Cor da polpa: amarela clara / 6  
Acabamento de pele: muito boa / 7,5  
Forma dos tubérculos: oval redonda / OR  
Regularidade da forma: regular / 7,5  
Tuberização: média alta / 7  
Calibre dos tubérculos: médio a grande / 7,5  
Regularidade do calibre: bastante regular / 6,5  
Dormência: média a curta / 5

### Sensibilidade e qualidade

Segundos crescimentos: moderadamente sensível / 6,5  
Manchas negras: ligeiramente sensível / 7,5  
Rachamentos: moderadamente sensível / 6  
Danos mecânicos: moderadamente sensível / 6  
Metribuzina: ligeiramente sensível / 7  
Metribuzina: ligeiramente sensível / 7,5  
Etileno: 5% menos a 5% mais tubérculos / 5  
Peso debaixo de água: 324  
Teor de matéria seca: 17,9%  
Grupo culinário: moderadamente firme / AB  
Descoloração após cozedura: moderadamente sensível / 6  
Descoloração em cru: muito sensível / 4  
Qualidade para fritura em palitos: inadequada / 4,5  
Distribuição da matéria seca: - / -  
Qualidade para fritura em rodela: inadequada / 4  
Nível TGA: 4,7

# How to grow



[www.agricopotatoes.pt](http://www.agricopotatoes.pt)

## Preparação da plantação <sup>1</sup>

**Azoto:** conselho padrão.

**Fósforo:** conselho padrão.

**Potássio:** conselho padrão.

## Tratamento da semente

Pode ser plantada imediatamente após retirada da câmara de frio, de preferência após curto choque térmico. Desgrelar pode ter um efeito negativo no rendimento e na regularidade do calibre.

## Planting distance

28/35 mm: 27 cm (50.000 plantas/ha)

35/55 mm: 33 cm (40.000 plantas/ha)

Plante Spectra um pouco mais fundo que as outras variedades para evitar tubérculos verdes.

<sup>1</sup> O nível de fertilização é baseado na análise de solo.

## Ervas daninhas

Após a emergência, uma utilização padrão de metribuzina pode provocar reações na folhagem e alguma perda de rendimento.

## Fungicidas

É necessário fazer um apertado calendário de tratamentos contra o míldio.

## Colheita

Devido à sua sensibilidade a manchas negras e danos mecânicos, esperar pelo menos 2 semanas para colher, após a aplicação do dessecante.

## Temperatura de armazenamento - Tempo de armazenamento

A temperatura preferencial de armazenamento é de 4°C. Adequada para períodos médios de armazenamento.



Say potato,  
say Agrico.

## Resistências

**Vírus do enrolamento:** - / -

**Vírus Yn:** ligeiramente suscetível / 6

**Vírus - Yntn (tubérculo):** ligeiramente suscetível / 7

**TRV:** suscetível / 5

**Míldio da folha:** muito suscetível / 4,5

**Míldio do tubérculo:** ligeiramente suscetível / 6

**Fusarium:** suscetível / 5,5

**Sarna comum:** suscetível / 5

**Sarna pulverulenta:** muito suscetível / 4

**Antracnose:** suscetível / 5

**Verruga negra F1:** resistente / 10

**Verruga negra F6:** - / -

**Verruga negra F18:** - / -

**Nemátode dourado Ro 1/4:** resistente / 9

**Nemátode dourado Ro 2/3:** - / -

**Nemátode, Globodera pallida Pa 2:** - / -

**Nemátode, Globodera pallida Pa 3:** - / -