RECOMENDAÇÃO DE CULTIVO

Spunta.

Variedade de ciclo médio com uma boa tolerância ao calor e elevado rendimento.

Tradicional

- **Tubérculos grandes**
- **Tubérculos de calibre uniforme**
- **Elevado teor de matéria seca**



Características

Características

Obtentor: J. Oldenburger
Cruzamento: BEA x USDA 96-56
Direito do obtentor: Expirado
Clone: Oldenburger 57-88

Características da planta e dos tubérculos

Maturação: semitardia / 6
Brolho de cor clara: violeta azul / BV
Cor da flor: branca / W
Número de bagas: inferior à média / 6,5
Folhagem - desenvolvimento inicial: rápido / 8
Folhagem - desenvolvimento final: bom / 8
Firmeza da folhagem: bastante firme / 7,5
Cor da pele: amarela / Y
Cor da polpa: amarela clara / 6
Acabamento de pele: média / 6
Forma dos tubérculos: longa / L
Regularidade da forma: bastante regular / 6
Tuberização: média / 6
Calibre dos tubérculos: grande / 8
Regularidade do calibre: regular / 7
Dormência: média / 6

Sensibilidade e qualidade

Segundos crescimentos: moderadamente sensível / 6
Manchas negras: ligeiramente sensível / 7
Rachamentos: ligeiramente sensível / 7
Danos mecânicos: muito sensível / 4
Metribuzina: ligeiramente sensível a não sensível / 8
Metribuzina: ligeiramente sensível a não sensível / 8
Etileno: - / -
Peso debaixo de água: 387
Teor de matéria seca: 21%
Grupo culinário: farinhenta / BC
Descoloração após cozedura: moderadamente sensível / 6,5
Descoloração em cru: - / -
Qualidade para fritura em palitos: média / 6
Distribuição da matéria seca: - / -
Qualidade para fritura em rodelas: inferior à média / 5,5
Nível TGA: -

A Agrico tomou todos os cuidados na elaboração da descrição desta variedade. No entanto, toda a informação pode estar sujeita a alterações e a Agrico não se responsabiliza por erros ou omissões. A Agrico não se responsabiliza por danos relacionados com as informações contidas nesta descrição.

AGRICO

RECOMENDAÇÃO DE CULTIVO

Conselhos de cultivo

www.agricopotatoes.pt

Preparacão da plantacão [1]

Azoto: conselho padrão - 10%.
Fósforo: conselho padrão.
Potássio: conselho padrão + 10%.

Tratamento da semente

Adequado pré-abrolhamento, após retirada do brolho principal, pode ter um impacto positivo na obtenção de um bom número de tubérculos.Desgrelar mais que uma vez pode ter um efeito negativo no rendimento e na regularidade do calibre.

Distância de plantação

28/35 mm: 27 cm (50.000 plantas/ha)
35/55 mm: 33 cm (40.000 plantas/ha)

[1] O nível de fertilização é baseado na análise de solo.

Ervas daninhas

Após a emergência, uma utilização padrão de metribuzina não provoca reações na folhagem ou perda de rendimento.

Fungicidas

É aconselhável fazer um calendário de tratamentos preventivos contra o míldio.

Colheita

Devido à sua sensibilidade a manchas negras e danos mecânicos, esperar pelo menos 3 semanas para colher, após a aplicação do dessecante.

Temperatura de armazenamento - Tempo de armazenamento

A temperatura preferencial de armazenamento é de 5ºC. Adequada para períodos médios de armazenamento.



Say potato, say Agrico.

Resistências

Vírus do enrolamento: ligeiramente suscetível / 6
Vírus Yn: ligeiramente suscetível / 6
Vírus - Yntn (tubérculo): ligeiramente suscetível / 6
TRV: ligeiramente suscetível / 6
Míldio da folha: suscetível / 5,5
Míldio do tubérculo: suscetível / 5
Fusarium: suscetível / 5,5
Sarna comum: suscetível / 5
Sarna pulverulenta: suscetível / 5
Antracnose: - / -
Verruga negra F1: resistente / 10
Verruga negra F6: - / -
Verruga negra F18: - / -
Nemátode dourado Ro 1/4: - / -
Nemátode dourado Ro 2/3: - / -
Nemátode, Globodera pallida Pa 2: suscetível / 2
Nemátode, Globodera pallida Pa 3: suscetível / 2

Agrico • Duit 15 • 8305 BB Emmeloord • Holanda +31 (0)527 63 99 11 info@agrico.nl www.agricopotatoes.pt