RECOMENDAÇÃO DE CULTIVO

Sidney.

Variedade semitardia, polpa cremosa, para a indústria de batatas fritas aos palitos.

Indústria
Palitos

- **Tubérculos grandes**
- **Boa resistência a vírus**
- **Boa distribuição da matéria seca e adequada para QSR.**



Características

Características

Obtentor: Agrico Research B.V.
Cruzamento: LADY ANNA x AR 05-3392
Clone: AR 12-1680

Características da planta e dos tubérculos

Maturação: semitardia / 6
Brolho de cor clara: - / -
Cor da flor: branca / W
Número de bagas: - / -
Folhagem - desenvolvimento inicial: bastante rápido / 7
Folhagem - desenvolvimento final: bastante bom / 7,5
Firmeza da folhagem: bastante firme / 7,5
Cor da pele: amarela / Y
Cor da polpa: cremosa / 5
Acabamento de pele: bastante fraca / 5
Forma dos tubérculos: longa oval / LO
Regularidade da forma: bastante regular / 6,5
Tuberização: média / 6
Calibre dos tubérculos: médio a grande / 7,5
Regularidade do calibre: bastante regular / 6,5
Dormência: média / 6,5

Sensibilidade e qualidade

Segundos crescimentos: moderadamente sensível / 6,5
Manchas negras: ligeiramente sensível / 7,5
Rachamentos: moderadamente sensível / 6,5
Danos mecânicos: ligeiramente sensível / 7
Metribuzina: moderadamente sensível / 6,5
Metribuzina: moderadamente sensível / 6,5
Etileno: 5% menos a 5% mais tubérculos / 5
Peso debaixo de água: 396
Teor de matéria seca: 21,5%
Grupo culinário: moderadamente farinhenta / B
Descoloração após cozedura: ligeiramente sensível / 7
Descoloração em cru: ligeiramente sensível / 7,5
Qualidade para fritura em palitos: excelente / 8
Distribuição da matéria seca: excelente / 8,5
Qualidade para fritura em rodelas: - / -
Nível TGA: 4,3 mg/100g

A Agrico tomou todos os cuidados na elaboração da descrição desta variedade. No entanto, toda a informação pode estar sujeita a alterações e a Agrico não se responsabiliza por erros ou omissões. A Agrico não se responsabiliza por danos relacionados com as informações contidas nesta descrição.

AGRICO

RECOMENDAÇÃO DE CULTIVO

Conselhos de cultivo

www.agricopotatoes.pt

Preparacão da plantacão [1]

Azoto: conselho padrão.De preferência fazer uma dose elevada na primeira cobertura; uma segunda aplicação é opcional.

Fósforo: conselho padrão.

Potássio: conselho padrão.

Tratamento da semente

Desgrelar pode ter um efeito negativo no rendimento e na regularidade do calibre.

Distância de plantação

28/35 mm: 26 cm (51.000 plantas/ha)
35/50 mm: 33 cm (40.000 plantas/ha)
50/55 mm:37 cm (36.000 plantas/ha)
Cut 50/60 mm: 34 cm (39.000 plants/ha)

[1] O nível de fertilização é baseado na análise de solo.

Ervas daninhas

Após a emergência não aplicar metribuzina, pois o seu uso provoca severa reação foliar e grande perda de rendimento.

Fungicidas

É necessário fazer um apertado calendário de tratamentos contra o míldio.

Colheita

Devido à sua sensibilidade a manchas negras e danos mecânicos, esperar pelo menos 3 semanas para colher, após a aplicação do dessecante.

Temperatura de armazenamento - Tempo de armazenamento

A temperatura preferencial de armazenamento é de 5ºC. Para fins industriais não armazenar a temperatura inferior a 7 ºC. Adequada para períodos médios de armazenamento.



Say potato, say Agrico.

Resistências

Vírus do enrolamento: - / -

Vírus Yn: ligeiramente suscetível a não suscetível / 8

Vírus - Yntn (tubérculo): ligeiramente suscetível / 7,5

TRV: ligeiramente suscetível a não suscetível / 8

Míldio da folha: muito suscetível / 4

Míldio do tubérculo: ligeiramente suscetível a não suscetível / 8

Fusarium: ligeiramente suscetível / 6

Sarna comum: suscetível / 5,5

Sarna pulverulenta: ligeiramente suscetível / 6

Antracnose: suscetível / 5,5

Verruga negra F1: muito suscetível* / 1*

Verruga negra F6: - / -

Verruga negra F18: - / -

Nemátode dourado Ro 1/4: resistente / 9

Nemátode dourado Ro 2/3: suscetível / 4

Nemátode, Globodera pallida Pa 2: resistente em campo / 8

Nemátode, Globodera pallida Pa 3: moderadamente suscetível / 6

Agrico • Duit 15 • 8305 BB Emmeloord • Holanda +31 (0)527 63 99 11 info@agrico.nl www.agricopotatoes.pt