RECOMENDAÇÃO DE CULTIVO

Riviera.

Tradicional

Variedade muito precoce de pele atrativa, excelente tolerância ao calor, boa resistência a vírus e bom rendimento.

- **Tubérculos grandes**
- **Excelente aspeto**
- **Boa resistência a vírus**

characteristics

Características

Obtentor: Mts. Boerhave

Cruzamento: MINERVA x ALCMARIA

Direito do obtentor: 31-12-2030

Clone: BH 86-0266

Características da planta e dos tubérculos

Maturação: muito precoce / 8

Brolho de cor clara: violeta azul / BV

Cor da flor: branca / W

Número de bagas: muito elevado / 4

Folhagem - desenvolvimento inicial: bastante rápido / 7

Folhagem - desenvolvimento final: médio / 7

Firmeza da folhagem: média / 6,5

Cor da pele: amarela / Y

Cor da polpa: amarela clara / 6

Acabamento de pele: excelente / 8

Forma dos tubérculos: oval redonda / OR

Regularidade da forma: bastante regular / 6

Tuberização: baixa a média / 5

Calibre dos tubérculos: médio a grande / 7,5

Regularidade do calibre: regular / 7

Dormência: média / 6

Sensibilidade e qualidade

Segundos crescimentos: moderadamente sensível / 6,5

Manchas negras: ligeiramente sensível a não sensível / 8

Rachamentos: moderadamente sensível / 6,5

Danos mecânicos: moderadamente sensível / 6

Metribuzina: ligeiramente sensível a não sensível / 8

Metribuzina: ligeiramente sensível a não sensível / 8

Bentazona: - / -

Etileno: 5% a 15% mais tubérculos / 6

Peso debaixo de água: 318

Teor de matéria seca: 17,7%

Grupo culinário: moderadamente firme / AB

Descoloração após cozedura: sensível / 5,5

Descoloração em cru: - / -

Qualidade para fritura em palitos: inadequada / 4,5

Distribuição da matéria seca: - / -

Qualidade para fritura em rodelas: inadequada / 4

Nível TGA: 4,8

A Agrico tomou todos os cuidados na elaboração da descrição desta variedade. No entanto, toda a informação pode estar sujeita a alterações e a Agrico não se responsabiliza por erros ou omissões. A Agrico não se responsabiliza por danos relacionados com as informações contidas nesta descrição.

AGRICO

RECOMENDAÇÃO DE CULTIVO

How to grow

www.agricopotatoes.pt

Preparacão da plantacão [1]

Azoto: conselho padrão + 10%.

Fósforo: conselho padrão.

Potássio: conselho padrão.

Tratamento da semente

Adequado pré-abrolhamento, após retirada do brolho principal, pode ter um impacto positivo na obtenção de um bom número de tubérculos.Desgrelar mais que uma vez pode ter um efeito negativo no rendimento e na regularidade do calibre.

Planting distance

28/35 mm: 22 cm (60.500 plantas/ha)

35/55 mm: 27 cm (50.000 plantas/ha)

[1] O nível de fertilização é baseado na análise de solo.

Ervas daninhas

Após a emergência, uma utilização padrão de metribuzina não provoca reações na folhagem ou perda de rendimento.

Fungicidas

É necessário fazer um apertado calendário de tratamentos contra o míldio.

Colheita

Devido à sua sensibilidade a manchas negras e danos mecânicos, esperar pelo menos 2 semanas para colher, após a aplicação do dessecante.

Temperatura de armazenamento - Tempo de armazenamento

A temperatura preferencial de armazenamento é de 4ºC. Adequada para expedição diretamente do campo ou curto armazenamento.

Say potato, say Agrico.

Resistências

Vírus do enrolamento: ligeiramente suscetível / 7

Vírus Yn: ligeiramente suscetível a não suscetível / 8

Vírus - Yntn (tubérculo): ligeiramente suscetível / 7

TRV: muito suscetível / 4

Míldio da folha: muito suscetível / 3

Míldio do tubérculo: suscetível / 5

Fusarium: ligeiramente suscetível / 6

Sarna comum: suscetível / 5,5

Sarna pulverulenta: muito suscetível / 2

Antracnose: suscetível / 5,5

Verruga negra F1: resistente / 10

Verruga negra F6: - / -

Verruga negra F18: - / -

Nemátode dourado Ro 1/4: resistente / 9

Nemátode dourado Ro 2/3: - / -

Nemátode, Globodera pallida Pa 2: - / -

Nemátode, Globodera pallida Pa 3: - / -

Agrico • Duit 15 • 8305 BB Emmeloord • Holanda +31 (0)527 63 99 11 info@agrico.nl www.agricopotatoes.pt