RECOMENDAÇÃO DE CULTIVO

Rudolph.

Variedade semitardia, de pele vermelha muito atrativa, boa tolerância ao calor e rendimento muito elevado.

- **Polpa branca**
- **Tubérculos grandes**
- **Boa conservação**

Tradicional



Características

Características

Obtentor: Agrico Research B.V.
Cruzamento: CHIEFTAIN x STIRLING
Direito do obtentor: 31-12-2035
Clone: UK 93-1-2

Características da planta e dos tubérculos

Maturação: semitardia / 5,5
Brolho de cor clara: violeta vermelha / RV
Cor da flor: roxa clara / LP
Número de bagas: médio / 6
Folhagem - desenvolvimento inicial: médio / 6
Folhagem - desenvolvimento final: bom / 8
Firmeza da folhagem: firme / 8
Cor da pele: vermelha / R
Cor da polpa: branca / 4
Acabamento de pele: boa / 7
Forma dos tubérculos: oval redonda / OR
Regularidade da forma: bastante regular / 6
Tuberização: baixa a média / 5
Calibre dos tubérculos: grande / 8
Regularidade do calibre: regular / 7
Dormência: média a longa / 7

Sensibilidade e qualidade

Segundos crescimentos: moderadamente sensível / 6,5
Manchas negras: ligeiramente sensível / 7
Rachamentos: moderadamente sensível / 6
Danos mecânicos: moderadamente sensível / 6
Metribuzina: ligeiramente sensível a não sensível / 8
Metribuzina: ligeiramente sensível / 7,5
Etileno: 5% a 15% mais tubérculos / 6
Peso debaixo de água: 376
Teor de matéria seca: 20,5%
Grupo culinário: moderadamente firme / AB
Descoloração após cozedura: moderadamente sensível / 6,5
Descoloração em cru: - / -
Qualidade para fritura em palitos: superior à média / 6,5
Distribuição da matéria seca: - / -
Qualidade para fritura em rodelas: inferior à média / 5,5
Nível TGA: 5,5 mg/100g

A Agrico tomou todos os cuidados na elaboração da descrição desta variedade. No entanto, toda a informação pode estar sujeita a alterações e a Agrico não se responsabiliza por erros ou omissões. A Agrico não se responsabiliza por danos relacionados com as informações contidas nesta descrição.

AGRICO

RECOMENDAÇÃO DE CULTIVO

Conselhos de cultivo

www.agricopotatoes.pt

Preparacão da plantacão [1]

Azoto: conselho padrão.Dividir a fertilização, fazendo a segunda aplicação pouco depois da tuberização.

Fósforo: conselho padrão.

Potássio: conselho padrão + 10%.

Tratamento da semente

Recomenda-se fazer um curto choque térmico ou pré-abrolhamento.Adequado pré-abrolhamento, após retirada do brolho principal, pode ter um impacto positivo na obtenção de um bom número de tubérculos.Desgrelar uma vez é opcional.

Distância de plantação

28/35 mm: 25 cm (54.000 plantas/ha)

35/55 mm: 33 cm (40.000 plantas/ha)

[1] O nível de fertilização é baseado na análise de solo.

Ervas daninhas

Após a emergência, uma utilização padrão de metribuzina pode provocar reações na folhagem e alguma perda de rendimento.

Fungicidas

É necessário fazer um apertado calendário de tratamentos contra o míldio.

Colheita

Devido à sua sensibilidade a manchas negras e danos mecânicos, esperar pelo menos 3 semanas para colher, após a aplicação do dessecante.

Temperatura de armazenamento - Tempo de armazenamento

A temperatura preferencial de armazenamento é de 5ºC. Adequada para períodos longos de armazenamento.



Say potato, say Agrico.

Resistências

Vírus do enrolamento: - / -

Vírus Yn: suscetível / 5

Vírus - Yntn (tubérculo): ligeiramente suscetível / 7

TRV: ligeiramente suscetível / 7

Míldio da folha: suscetível / 5,5

Míldio do tubérculo: suscetível / 5,5

Fusarium: ligeiramente suscetível / 6

Sarna comum: suscetível / 5

Sarna pulverulenta: ligeiramente suscetível / 7

Antracnose: ligeiramente suscetível / 7

Verruga negra F1: resistente / 10

Verruga negra F6: moderadamente suscetível / 8

Verruga negra F18: - / -

Nemátode dourado Ro 1/4: - / -

Nemátode dourado Ro 2/3: - / -

Nemátode, Globodera pallida Pa 2: - / -

Nemátode, Globodera pallida Pa 3: - / -

Agrico • Duit 15 • 8305 BB Emmeloord • Holanda +31 (0)527 63 99 11 info@agrico.nl www.agricopotatoes.pt