RECOMENDAÇÃO DE CULTIVO

Sevilla.

Variedade tardia com bom peso dentro de água, muito saborosa e resistente ao míldio da folha.

Biológico

Indústria
Palitos
Rodelas

- **Resistente ao míldio**
- **Baixa necessidade em azoto**
- **Boa tolerância à secura**



Características

Características

Obtentor: N. Vos
Cruzamento: AGRIA x DOB 1997-507-015
Direito do obtentor: 31-12-2048
Clone: VOS 2006-001-001

Características da planta e dos tubérculos

Maturação: tardia / 4,5
Brolho de cor clara: - / -
Cor da flor: roxa / P
Número de bagas: - / -
Folhagem - desenvolvimento inicial: bastante rápido / 7,5
Folhagem - desenvolvimento final: bastante bom / 7,5
Firmeza da folhagem: bastante firme / 7,5
Cor da pele: amarela / Y
Cor da polpa: amarela / 7
Acabamento de pele: inferior á média / 5,5
Forma dos tubérculos: oval / O
Regularidade da forma: bastante regular / 6
Tuberização: média alta / 7
Calibre dos tubérculos: médio a grande / 7
Regularidade do calibre: bastante regular / 6,5
Dormência: longa / 8

Sensibilidade e qualidade

Segundos crescimentos: moderadamente sensível / 6
Manchas negras: ligeiramente sensível / 7
Rachamentos: moderadamente sensível / 6,5
Danos mecânicos: sensível / 5,5
Metribuzina: ligeiramente sensível a não sensível / 8
Metribuzina: ligeiramente sensível a não sensível / 8
Etileno: - / -
Peso debaixo de água: 385
Teor de matéria seca: 21%
Grupo culinário: farinhenta / C
Descoloração após cozedura: ligeiramente sensível / 7,5
Descoloração em cru: moderadamente sensível / 6
Qualidade para fritura em palitos: muito boa / 7,5
Distribuição da matéria seca: boa / 7
Qualidade para fritura em rodelas: - / -
Nível TGA: -

A Agrico tomou todos os cuidados na elaboração da descrição desta variedade. No entanto, toda a informação pode estar sujeita a alterações e a Agrico não se responsabiliza por erros ou omissões. A Agrico não se responsabiliza por danos relacionados com as informações contidas nesta descrição.

AGRICO

RECOMENDAÇÃO DE CULTIVO

Conselhos de cultivo

www.agricopotatoes.pt

Preparacão da plantacão [1]

Azoto: conselho padrão - 10%.

Fósforo: conselho padrão.

Potássio: conselho padrão.

Tratamento da semente

Recomenda-se fazer um curto choque térmico ou pré-abrolhamento.Desgrelar mais que uma vez pode ter um efeito negativo no rendimento e na regularidade do calibre.

Distância de plantação

28/35 mm: 20 cm (67.000 plants/ha)

35/55 mm: 28 cm (48.000 plants/ha)

[1] O nível de fertilização é baseado na análise de solo.

Ervas daninhas

Após a emergência, uma utilização padrão de metribuzina não provoca reações na folhagem ou perda de rendimento.

Fungicidas

Apesar da resistência ao míldio, deve estar-se alerta a possíveis infeções.

Colheita

Devido à sua sensibilidade a manchas negras e danos mecânicos, esperar pelo menos 3 semanas para colher, após a aplicação do dessecante.

Temperatura de armazenamento - Tempo de armazenamento

A temperatura preferencial de armazenamento é de 7 ºC. Adequada para períodos longos de armazenamento.



Say potato, say Agrico.

Resistências

Vírus do enrolamento: - / -

Vírus Yn: - / -

Vírus - Yntn (tubérculo): - / -

TRV: ligeiramente suscetível / 6

Míldio da folha: ligeiramente suscetível a não suscetível / 9

Míldio do tubérculo: - / -

Fusarium: suscetível / 5

Sarna comum: muito suscetível / 4,5

Sarna pulverulenta: - / -

Antracnose: - / -

Verruga negra F1: - / -

Verruga negra F6: - / -

Verruga negra F18: - / -

Nemátode dourado Ro 1/4: - / -

Nemátode dourado Ro 2/3: - / -

Nemátode, Globodera pallida Pa 2: - / -

Nemátode, Globodera pallida Pa 3: - / -

Agrico • Duit 15 • 8305 BB Emmeloord • Holanda +31 (0)527 63 99 11 info@agrico.nl www.agricopotatoes.pt