
RECOMENDAÇÃO DE CULTIVO

Leonore.

Variedade para a indústria, precoce, de boa produção e bom teor de matéria seca.

Indústria
Palitos

- **Precoce**
- **Boa resistência a vírus**
- **Tubérculos longo ovais com bom acabamento de pele**



Características

Características

Obtentor: Agrico Research B.V.
Cruzamento: EXCELLENCY x AR 06-3754
Clone: AR 13-1059

Características da planta e dos tubérculos

Maturação: precoce / 7,5
Brolho de cor clara: - / -
Cor da flor: branca / W
Número de bagas: nenhuma / 8
Folhagem - desenvolvimento inicial: rápido / 8
Folhagem - desenvolvimento final: bom / 8
Firmeza da folhagem: bastante firme / 7
Folhagem - seletividade: média / 6,5
Cor da pele: amarela / Y
Cor da polpa: amarela / 7
Acabamento de pele: boa / 7
Forma dos tubérculos: longa oval / LO
Regularidade da forma: bastante regular / 6
Tuberização: média / 6,5
Calibre dos tubérculos: médio a grande / 7,5
Regularidade do calibre: bastante regular / 6,5
Dormência: média / 6

Sensibilidade e qualidade

Segundos crescimentos: moderadamente sensível / 6,5
Manchas negras: ligeiramente sensível a não sensível / 8
Rachamentos: moderadamente sensível / 6,5
Danos mecânicos: moderadamente sensível / 6,5
Metribuzina: moderadamente sensível / 6,5
Metribuzina: ligeiramente sensível / 7
Bentazona: - / -
Etileno: 5% menos a 5% mais tubérculos / 5
Peso debaixo de água: 397
Teor de matéria seca: 21,5%
Grupo culinário: farinhenta / BC
Descoloração após cozedura: ligeiramente sensível / 7
Descoloração em cru: muito sensível / 4,5
Qualidade para fritura em palitos: boa / 7
Distribuição da matéria seca: boa / 7,5
Qualidade para fritura em rodelas: - / -
Nível TGA: 6,7
Óleo de carvona: 5% menos a 5% mais tubérculos / 5

AGRICO

A Agrico tomou todos os cuidados na elaboração da descrição desta variedade. No entanto, toda a informação pode estar sujeita a alterações e a Agrico não se responsabiliza por erros ou omissões. A Agrico não se responsabiliza por danos relacionados com as informações contidas nesta descrição.

EUROBATATA

RECOMENDAÇÃO DE CULTIVO

Conselhos de cultivo

www.agricopotatoes.pt

Preparacão da plantacão [1]

Azoto: conselho padrão + 10%.

Fósforo: conselho padrão.

Potássio: conselho padrão.

Tratamento da semente

Desgrelar mais que uma vez pode ter um efeito negativo no rendimento e na regularidade do calibre.

Distância de plantação

28/35 mm: 24 cm (55.000 plantas/ha)

35/55 mm: 31 cm (42.000 plantas/ha)

Plante Leonore um pouco mais fundo que as outras variedades para evitar tubérculos verdes.

[1] O nível de fertilização é baseado na análise de solo.

Ervas daninhas

Após a emergência, uma utilização padrão de metribuzina pode provocar reações na folhagem ou perda de rendimento, mas raramente perda de produção.

Fungicidas

É necessário fazer um apertado calendário de tratamentos contra o míldio.

Colheita

Devido à sua sensibilidade a manchas negras e danos mecânicos, esperar pelo menos 2 semanas para colher, após a aplicação do dessecante.

Temperatura de armazenamento - Tempo de armazenamento

A temperatura preferencial de armazenamento é de 7 ºC. Adequada para expedição diretamente do campo ou curto armazenamento.



Say potato, say Agrico.

Resistências

Vírus do enrolamento: - / -

Vírus Yn: ligeiramente suscetível / 7,5

Vírus - Yntn (tubérculo): ligeiramente suscetível / 6

TRV: suscetível / 5,5

Míldio da folha: muito suscetível / 3,5

Míldio do tubérculo: suscetível / 5

Fusarium: ligeiramente suscetível / 6

Sarna comum: ligeiramente suscetível / 6

Sarna pulverulenta: muito suscetível / 3

Vírus A: - / -

Vírus X: - / -

Antracnose: suscetível / 5

Erwinia: - / -

Verruga negra F1: resistente / 10

Verruga negra F6: - / -

Verruga negra F18: - / -

Nemátode dourado Ro 1/4: resistente / 9

Nemátode dourado Ro 2/3: - / -

Nemátode, Globodera pallida Pa 2: - / -

Nemátode, Globodera pallida Pa 3: - / -

AGRICO

Eurobatata • Av. dos Combatentes s/n, Apartado 63 2040-998 • Rio Maior

+315 212 338 150 comercial@eurobatata.pt www.eurobatata.pt

EUROBATATA