


# Leonore.

Variedade para a indústria, precoce, de boa produção e bom teor de matéria seca.



**Indústria**  
Palitos

- ▶ **Precoce**
- ▶ **Boa resistência a vírus**
- ▶ **Tubérculos longo ovais com bom acabamento de pele**



## CARACTERÍSTICAS

### Características

Obtentor: Agrico Research B.V.

Cruzamento: EXCELLENCY x AR 06-3754

Clone: AR 13-1059

### Características da planta e dos tubérculos

Maturação: precoce / 7,5

Brolho de cor clara: - / -

Cor da flor: branca / W

Número de bagas: nenhuma / 8

Folhagem - desenvolvimento inicial: rápido / 8

Folhagem - desenvolvimento final: bom / 8

Firmeza da folhagem: bastante firme / 7

Folhagem - seletividade: média / 6,5

Cor da pele: amarela / Y

Cor da polpa: amarela / 7

Acabamento de pele: boa / 7

Forma dos tubérculos: longa oval / LO

Regularidade da forma: bastante regular / 6

Tuberização: média / 6,5

Calibre dos tubérculos: médio a grande / 7,5

Regularidade do calibre: bastante regular / 6,5

Dormência: média / 6

### Sensibilidade e qualidade

Segundos crescimentos: moderadamente sensível / 6,5

Manchas negras: ligeiramente sensível a não sensível / 8

Rachamentos: moderadamente sensível / 6,5

Danos mecânicos: moderadamente sensível / 6,5

Metribuzina: moderadamente sensível / 6,5

Metribuzina: ligeiramente sensível / 7

Bentazona: - / -

Etileno: 5% menos a 5% mais tubérculos / 5

Peso debaixo de água: 397

Teor de matéria seca: 21,5%

Grupo culinário: farinhenta / BC

Descoloração após cozedura: ligeiramente sensível / 7

Descoloração em cru: muito sensível / 4,5

Qualidade para fritura em palitos: boa / 7

Distribuição da matéria seca: boa / 7,5

Qualidade para fritura em rodela: - / -

Nível TGA: 6,7

Óleo de carvona: 5% menos a 5% mais tubérculos / 5

# CONSELHOS DE CULTIVO



[www.agricopotatoes.pt](http://www.agricopotatoes.pt)

## Preparação da plantação <sup>1</sup>

**Azoto:** conselho padrão + 10%.

**Fósforo:** conselho padrão.

**Potássio:** conselho padrão.

## Tratamento da semente

Desgrelar mais que uma vez pode ter um efeito negativo no rendimento e na regularidade do calibre.

## Planting distance

28/35 mm: 24 cm (55.000 plantas/ha)

35/55 mm: 31 cm (42.000 plantas/ha)

Plante Leonore um pouco mais fundo que as outras variedades para evitar tubérculos verdes.

<sup>1</sup> O nível de fertilização é baseado na análise de solo.

## Ervas daninhas

Após a emergência, uma utilização padrão de metribuzina pode provocar reações na folhagem ou perda de rendimento, mas raramente perda de produção.

## Fungicidas

É necessário fazer um apertado calendário de tratamentos contra o míldio.

## Colheita

Devido à sua sensibilidade a manchas negras e danos mecânicos, esperar pelo menos 2 semanas para colher, após a aplicação do dessecante.

## Temperatura de armazenamento - Tempo de armazenamento

A temperatura preferencial de armazenamento é de 7 °C. Adequada para expedição diretamente do campo ou curto armazenamento.



**Say potato,  
say Agrico.**

## Resistências

Vírus do enrolamento: - / -

Vírus Yn: ligeiramente suscetível / 7,5

Vírus - Yntn (tubérculo): ligeiramente suscetível / 6

TRV: suscetível / 5,5

Míldio da folha: muito suscetível / 3,5

Míldio do tubérculo: suscetível / 5

Fusarium: ligeiramente suscetível / 6

Sarna comum: ligeiramente suscetível / 6

Sarna pulverulenta: muito suscetível / 3

Vírus A: - / -

Vírus X: - / -

Antracnose: suscetível / 5

Erwinia: - / -

Verruga negra F1: resistente / 10

Verruga negra F6: - / -

Verruga negra F18: - / -

Nemátode dourado Ro 1/4: resistente / 9

Nemátode dourado Ro 2/3: - / -

Nemátode, Globodera pallida Pa 2: - / -

Nemátode, Globodera pallida Pa 3: - / -