
RECOMENDAÇÃO DE CULTIVO

Paradiso.

Variedade semitardia, para o mercado tradicional, de tubérculos grandes e excelente rendimento.

- **Excelente aspeto**
- **Elevado rendimento**
- **Folhas firmes**
- **Crescimento forte**

Tradicional



Características

Características

Obtentor: M. Pot & M. Klaver
Cruzamento: RODEO x VALOR
Direito do obtentor: 31-12-2048
Clone: PK 06-0108

Características da planta e dos tubérculos

Maturação: semitardia / 6
Brolho de cor clara: vermelha / R
Cor da flor: roxa / P
Número de bagas: inferior à média / 6,5
Folhagem - desenvolvimento inicial: bastante rápido / 7,5
Folhagem - desenvolvimento final: bastante bom / 7,5
Firmeza da folhagem: bastante firme / 7
Folhagem - seletividade: bastante fácil / 7
Cor da pele: amarela / Y
Cor da polpa: amarela clara / 6
Acabamento de pele: boa / 7
Forma dos tubérculos: oval alongada / OL
Regularidade da forma: bastante regular / 6,5
Tuberização: média / 6
Calibre dos tubérculos: grande / 8
Regularidade do calibre: bastante regular / 6,5
Dormência: média / 6

Sensibilidade e qualidade

Segundos crescimentos: ligeiramente sensível / 7
Manchas negras: ligeiramente sensível / 7,5
Rachamentos: moderadamente sensível / 6,5
Danos mecânicos: moderadamente sensível / 6,5
Metribuzina: ligeiramente sensível a não sensível / 8
Metribuzina: moderadamente sensível / 6,5
Bentazona: moderadamente sensível / 6,5
Etileno: 5% a 15% mais tubérculos / 6
Peso debaixo de água: 329
Teor de matéria seca: 18,2%
Grupo culinário: moderadamente farinhenta / B
Descoloração após cozedura: moderadamente sensível / 6,5
Descoloração em cru: - / -
Qualidade para fritura em palitos: inadequada / 4,5
Distribuição da matéria seca: - / -
Qualidade para fritura em rodelas: inadequada / 4
Nível TGA: 4,8
Óleo de carvona: 5% menos tubérculos / 4

AGRICO

A Agrico tomou todos os cuidados na elaboração da descrição desta variedade. No entanto, toda a informação pode estar sujeita a alterações e a Agrico não se responsabiliza por erros ou omissões. A Agrico não se responsabiliza por danos relacionados com as informações contidas nesta descrição.

EUROBATATA

RECOMENDAÇÃO DE CULTIVO

Conselhos de cultivo

www.agricopotatoes.pt

Preparacão da plantacão [1]

Azoto: conselho padrão - 20%.Dividir a fertilização, fazendo a segunda aplicação pouco depois da tuberização.

Fósforo: conselho padrão.

Potássio: conselho padrão.

Tratamento da semente

Desgrelar pode ter um efeito negativo no rendimento e na regularidade do calibre.

Distância de plantação

28/35 mm: 23 cm (58.000 plantas/ha)

35/55 mm: 33 cm (40.000 plantas/ha)

[1] O nível de fertilização é baseado na análise de solo.

Ervas daninhas

Após a emergência, uma utilização padrão de metribuzina não provoca reações na folhagem ou perda de rendimento.

Fungicidas

É aconselhável fazer um calendário de tratamentos preventivos contra o míldio.

Colheita

Devido à sua sensibilidade a manchas negras e danos mecânicos, esperar pelo menos 2 semanas para colher, após a aplicação do dessecante.

Temperatura de armazenamento - Tempo de armazenamento

A temperatura preferencial de armazenamento é de 4ºC. Adequada para períodos médios de armazenamento.



Say potato, say Agrico.

Resistências

Vírus do enrolamento: - / -

Vírus Yn: ligeiramente suscetível / 6

Vírus - Yntn (tubérculo): ligeiramente suscetível / 7,5

TRV: muito suscetível / 4

Míldio da folha: suscetível / 5,5

Míldio do tubérculo: ligeiramente suscetível / 6,5

Fusarium: suscetível / 5

Sarna comum: suscetível / 5,5

Sarna pulverulenta: ligeiramente suscetível / 7,5

Vírus A: - / -

Vírus X: - / -

Antracnose: suscetível / 5,5

Erwinia: - / -

Verruga negra F1: resistente / 10

Verruga negra F6: - / -

Verruga negra F18: - / -

Nemátode dourado Ro 1/4: resistente / 9

Nemátode dourado Ro 2/3: - / -

Nemátode, Globodera pallida Pa 2: - / -

Nemátode, Globodera pallida Pa 3: - / -

Eurobatata • Av. dos Combatentes s/n, Apartado 63 2040-998 • Rio Maior
+315 212 338 150 comercial@eurobatata.pt www.eurobatata.pt