PREPORUKA ZA GAJENJE

Vogue.

Druga rana konzumna sorta sa sa uniformnom krupnoćom i krupnim krtolama.

- **Prilično otporna na raskuvavanje**
- **Krupne krtole**
- **Rana tuberizacija**

Tradicionalno



Karakteristike

Opšte karakteristike

Selekcioner: Konst Research B.V.
Ukrštanje: MARABEL x AMOROSA
Pravo oplemenjivača: 31-12-2046
Perspekrtivni klonovi: KO 03-2027

Karakteristike biljke i krtola

Stasavanje: drugi rani / 6,5
Svetla boja klice: zelena-crvena / GR
Boja cveta: bela / W
Broj bobica: veoma visok / 4
Cima - početni razvoj: prilično brz / 7
Cima - završni razvoj: prilično dobar / 7,5
Cima - čvrstina: prilično čvrsta / 7
Boja pokožice: žuta / Y
Boja mesa: žuta / 7
Formiranost pokožice: prosečna / 6
Oblik krtola: ovalno-izdužene / OL
Pravilnost oblika krtola: pravilan / 7
Tuberizacija: prilično malo / 5,5
Krupnoća krtola: krupne / 8
Pravilnost krupnoće: pravilan / 7
Dormantnost: prilično kratka / 5

Osetljivost i kvalitet

Sekundarni rast: prilično osetljiva / 6,5
Unutrašnje modrice: blago do nije osetljiva / 8
Pucanje krtola: prilično osetljiva / 6,5
Povrede kod vađenja: prilično osetljiva / 6
Metribuzin - pre nicanja: blago do nije osetljiva / 8
Metribuzin - posle nicanja: blago osetljiva / 7,5
Bentazon: blago osetljiva / 7
Etilen: 5% manje do 5% više krtola / 5
Specifična težina u vodi: 311
Sadržaj suve materije: 17,3%
Tip raskuvavanja: prilično čvrsta / AB
Tamnjenje posle raskuvavanja: blago osetljiva / 7,5
Promena boje pre kuvanja: - / -
Kvalitet za prženje: nije pogodna / 5
Distribucija suve materije: - / -
Kvalitet hrskavosti: nije pogodna / 4
TGA-nivo: 3,7

Agrico je uložio zavidan napor da bi se dobio što precizniji opis ove sorte. Međutim, imajte na umu da sve informacije mogu biti podložne promeni i Agrico ne prihvata odgovornost za greške ili propuste. Agrico ni u kom slučaju neće biti odgovoran za štetu koja nastane kod nas ili u vezi sa informacijama sadržanim u ovom opisu.

PREPORUKA ZA GAJENJE

Preporuke za gajenje

www.agricopotatoes.rs

Đubrenje i tretman semena [1]

Azot: standardni savet -10 %.Poželjna je split aplikacija, drugu prihranu uraditi ubrzo posle zametanja krtola.

Fosfor: standardni savet.

Kalijum: standardni savet +10 %.

Tretman semena

Pravilno naklijavanje posle zalamanja vršne klice daje pozitivan uticaj na bolje zametanje krtola.Zalamanje klice više od jedan put imaće negativan uticaj na prinos i ujednačenost krupnoće krtola.

Rastojanje u sadnji

28/35 mm: 22 cm (60.500 biljaka/ha)
35/55 mm: 27 cm (50.000 biljaka/ha)

Korovi

Posle nicanja, standardno korišćenje metribuzina (Sencor) ne daje reakciju na cimi ili smanjenju prinosa.

Fungicidi

Neophodan je strogi preventivni raspored prskanja protiv plamenjače.

Vađenje

Zbog ocene osetljivosti na pojavu modrica na krtolama i/ili oštećenja tokom vađenja, sačekajte sa vađenjem najmanje tri nedelje nakon uništavanja cime.

Temperatura skladištenja - Vreme skladištenja

Poželjna temperatura skladištenja je 5 °C. Pogodna za isporuku direktno sa njive ili posle kraćeg skladištenja.



Say potato, say Agrico.

Otpornost

Virus uvijenosti lista: - / -
Virus - Yn: blago osetljiva / 6,5
Virus - Yntn (na krtolama): osetljiva / 5
Prskanje: veoma osetljiva / 4
Plamenjača - cima: veoma osetljiva / 4
Plamenjača - krtole: blago osetljiva / 6
Fusarium: blago osetljiva / 6,5
Obična krastavost: blago osetljiva / 6
Prašna krastavost: veoma osetljiva / 2
Crne pege: veoma osetljiva / 4,5
Rak krompira F1: blago osetljiva / 9
Rak krompira F6: - / -
Rak krompira F18: - / -
Zlatne nematode Ro1/4: otporna / 9
Zlatne nematode Ro2/3: - / -
Bele nematode Pa 2: - / -
Bele nematode Pa 3: - / -

AGRICO

Arum Deč. • Borhesova 31 • 11080 Beograd • Zemun Srbija (+381) 11 3774 706
info@arum.rs www.agricopotatoes.rs

ARUM DEČ