

Sidney.

Srednje stasna sorta, belog mesa,
namenjena za preradu u pomfrit.



Prerada
Pomfrit

- ▶ Daje krupne krtole
- ▶ Dobre otpornosti prema virusima
- ▶ Dug period mirovanja klice



Karakteristike

Opšte karakteristike

Selekcioner: Agrico Research B.V.

Ukrštanje: LADY ANNA x AR 05-3392

Perspektivni klonovi: AR 12-1680

Karakteristike biljke i krtola

Stasavanje: rani glavni usev / 6

Svetla boja klice: - / -

Boja cveta: bela / W

Broj bobica: - / -

Cima - početni razvoj: prilično brz / 7

Cima - završni razvoj: prilično dobar / 7,5

Cima - čvrstina: prilično čvrsta / 7,5

Boja pokožice: žuta / Y

Boja mesa: bela / 4,5

Formiranost pokožice: prilično loša / 5

Oblik krtola: izduženo-ovalne / LO

Pravilnost oblika krtola: prilično pravilan / 6,5

Tuberizacija: srednja / 6

Krupnoća krtola: prilično krupne / 7,5

Pravilnost krupnoće: prilično pravilan / 6,5

Dormantnost: srednja / 6,5

Osetljivost i kvalitet

Sekundarni rast: prilično osetljiva / 6,5

Unutrašnje modrice: blago osetljiva / 7,5

Pucanje krtola: prilično osetljiva / 6

Povrede kod vađenja: blago osetljiva / 7

Metribuzin - pre nicanja: prilično osetljiva / 6,5

Metribuzin - posle nicanja: prilično osetljiva / 6,5

Bentazon: - / -

Etilen: 5% manje do 5% više krtola / 5

Specifična težina u vodi: 396

Sadržaj suve materije: 21,5%

Tip raskuvavanja: prilično brašnava / B

Tamnjenje posle raskuvavanja: blago osetljiva / 7

Promena boje pre kuvanja: blago osetljiva / 7,5

Kvalitet za prženje: iznad proseka / 6,5

Distribucija suve materije: odličan / 8,5

Kvalitet hrskavosti: - / -

TGA-nivo: 4,3



Preporuke za gajenje

www.agricopotatoes.rs

Đubrenje i tretman semena ¹

Azot: standardni savet.

Fosfor: standardni savet.

Kalijum: standardni savet +10 %.

Tretman semena

Može se saditi direktno po iznošenju iz hladnog skladišta, poželjno je posle izlaganja kratkom temperaturnom šoku. Zalamanje klice više od jedan put imaće negativan uticaj na prinos i ujednačenost krupnoće krtola.

Rastojanje u sadnji

28/35 mm: 26 cm (51.000 plants/ha)

35/55 mm: 33 cm (40.000 plants/ha)

50/55 mm: 37 cm (36.000 plants/ha)

Korovi

Posle nicanja, ne koristite metribuzin (Sencor), jer daje jaku reakciju na cimi i ozbiljno smanjenje prinosa.

Fungicidi

Neophodan je strogi preventivni raspored prskanja protiv plamenjače.

Vađenje

Zbog ocene osetljivosti na pojavu modrica na krtolama i/ili oštećenja tokom vađenja, sačekajte sa vađenjem najmanje tri nedelje nakon uništavanja cime.

Temperatura skladištenja - Vreme skladištenja

Poželjna temperatura skladištenja je 5 °C. Za potrebe prerade, ne skladištite ispod 7 °C. Pogodna za kraće skladištenje.



Say potato,
say Agrico.

Otpornost

Virus uvijenosti lista: - / -

Virus - Yn: blago do nije osetljiva / 8

Virus - Yntn (na krtolama): blago osetljiva / 7,5

Prskanje: blago do nije osetljiva / 8

Plamenjača - cima: veoma osetljiva / 4

Plamenjača - krtole: blago do nije osetljiva / 8

Fusarium: blago osetljiva / 6

Obična krastavost: osetljiva / 5,5

Prašna krastavost: blago osetljiva / 6

Crne pege: osetljiva / 5,5

Rak krompira F1: veoma osetljiva* / 1*

Rak krompira F6: - / -

Rak krompira F18: - / -

Zlatne nematode Ro1/4: otporna / 9

Zlatne nematode Ro2/3: osetljiva / 4

R_Golden nematode Ro 5: osetljiva* / 4*

Bele nematode Pa 2: otpornost u polju / 8

Bele nematode Pa 3: srednje osetljiva / 6