

Leonore (AR 13-1059).

Rana sorta za industrijsku preradu sa dobrim prinosima i sadržajem suve materije




Prerada
Pomfrit



Tradicionalno

- » **Ranostasna sorta**
- » **Dobra otpornost na viruse**
- » **Izduženo-ovalne krtole sa vrlo lepom pokožicom**



Karakteristike

Opšte karakteristike

Selekcioner: Agrico Research B.V.
Ukrštanje: EXCELLENCY x AR 06-3754
Perspektivni klonovi: AR 13-1059

Karakteristike biljke i krtola

Stasavanje: rani glavni usev / 7,5
Svetla boja klice: - / -
Boja cveta: bela / W
Broj bobica: nijedna / 8
Cima - početni razvoj: brz / 8
Cima - završni razvoj: dobar / 8
Cima - čvrstina: prilično čvrsta / 7
Boja pokožice: žuta / Y
Boja mesa: žuta / 7
Formiranost pokožice: dobra / 7
Oblik krtola: izduženo-ovalne / LO
Pravilnost oblika krtola: prilično pravilan / 6
Tuberizacija: srednja / 6,5
Krupnoća krtola: prilično krupne / 7,5
Pravilnost krupnoće: prilično pravilan / 6,5
Dormantnost: srednja / 6

Osetljivost i kvalitet

Sekundarni rast: prilično osetljiva / 6,5
Unutrašnje modrice: blago do nije osetljiva / 8
Pucanje krtola: prilično osetljiva / 6,5
Povrede kod vađenja: prilično osetljiva / 6,5
Metribuzin - pre nicanja: prilično osetljiva / 6,5
Metribuzin - posle nicanja: blago osetljiva / 7
Bentazon: - / -
Etilen: 5% manje do 5% više krtola / 5
Specifična težina u vodi: 397
Sadržaj suve materije: 21,5%
Tip raskuvavanja: brašnava / BC
Tamnjenje posle raskuvavanja: blago osetljiva / 7
Promena boje pre kuvanja: veoma osetljiva / 4,5
Kvalitet za prženje: dobra / 7
Distribucija suve materije: dobar / 7,5
Kvalitet hrskavosti: - / -
TGA-nivo: 6,7

Preporuke za gajenje



www.agricopotatoes.rs

Đubrenje i tretman semena ¹

Azot: standardni savet +10 %.

Fosfor: standardni savet.

Kalijum: standardni savet.

Tretman semena

Zalamanje klice može imati negativan uticaj na prinos i ujednačenost krupnoće krtola.

Rastojanje u sadnji

28/35 mm: 24 cm (55.000 plants/ha)

35/55 mm: 31 cm (42.000 plants/ha)

Saditi sortu Leonore malo dublje u odnosu na druge sorte da bi se izbeglo zelenjenje krtola.

Korovi

Posle nicanja, standardno korišćenje metribuzina (Sencor) može dati reakciju na cimi, ali retko utiče na smanjenje prinosa.

Fungicidi

Neophodan je strogi preventivni raspored prskanja protiv plamenjače.

Vađenje

Zbog ocene osetljivosti na pojavu modrica na krtolama i/ili oštećenja tokom vađenja, sačekajte sa vađenjem najmanje dva nedelje nakon uništavanja cime.

Temperatura skladištenja - Vreme skladištenja

Poželjna temperatura skladištenja je 7 °C. Pogodna za isporuku direktno sa njive ili posle kraćeg skladištenja.



Say potato,
say Agrico.

Otpornost

Virus uvijenosti lista: - / -

Virus - Yn: blago osetljiva / 7,5

Virus - Yntn (na krtolama): blago osetljiva / 6

Prskanje: osetljiva / 5,5

Plamenjača - cima: veoma osetljiva / 3,5

Plamenjača - krtole: osetljiva / 5

Fusarium: blago osetljiva / 6

Obična krastavost: blago osetljiva / 6

Prašna krastavost: veoma osetljiva / 3

Crne pege: osetljiva / 5

Rak krompira F1: otporna / 10

Rak krompira F6: - / -

Rak krompira F18: - / -

Zlatne nematode Ro1/4: otporna / 9

Zlatne nematode Ro2/3: - / -

Bele nematode Pa 2: - / -

Bele nematode Pa 3: - / -