

Agria.

Glavni usev, sorta za preradu sa žutim mesom, dobrim prinosom i stabilnim kvalitetom.



Organska



Prerada

Pomfrit
Čips
Pogodnost



Maloprodaja

Svež



Tradicionalno

- » **Odličan kvalitet za prženje**
- » **Višestruka otpornost na viruse**
- » **Dobro skladištenje**



Karakteristike

Opšte karakteristike

Selekcioner: Böhm
Ukrštanje: QUARTA x SEMLO
Pravo oplemenjivača: Isteklo
Perspektivni klonovi: BM 77-0945

Karakteristike biljke i krtola

Stasavanje: glavni usev / 5
Svetla boja klice: plavo-ljubičasta / BV
Boja cveta: bela / W
Broj bobica: nijedna / 8
Cima - početni razvoj: prilično brz / 7
Cima - završni razvoj: dobar / 8
Cima - čvrstina: prilično čvrsta / 7
Boja pokožice: žuta / Y
Boja mesa: žuta / 7
Formiranost pokožice: prosečna / 6
Oblik krtola: ovalno-izdužene / OL
Pravilnost oblika krtola: pravilan / 7
Tuberizacija: prilično malo / 5
Krupnoća krtola: krupne / 8
Pravilnost krupnoće: pravilan / 7
Dormantnost: duga / 8

Osetljivost i kvalitet

Sekundarni rast: prilično osetljiva / 6
Unutrašnje modrice: prilično osetljiva / 6
Pucanje krtola: prilično osetljiva / 6,5
Povrede kod vađenja: osetljiva / 5
Metribuzin - pre nicanja: blago osetljiva / 7,5
Metribuzin - posle nicanja: blago osetljiva / 7,5
Bentazon: prilično osetljiva / 6,5
Etilen: 5% do 15% više krtola / 6
Specifična težina u vodi: 402
Sadržaj suve materije: 21,8%
Tip raskuvavanja: brašnava / BC
Tamnjenje posle raskuvavanja: blago osetljiva / 7
Promena boje pre kuvanja: blago osetljiva / 7
Kvalitet za prženje: odlična / 8
Distribucija suve materije: srednji / 6,5
Kvalitet hrskavosti: dobra / 7
TGA-nivo: 2,7



Preporuke za gajenje

www.agricopotatoes.rs

Đubrenje i tretman semena ¹

Azot: standardni savet -10 %.

Fosfor: standardni savet.

Kalijum: standardni savet +10 %.

Tretman semena

Preporučuje se kratak temperaturni šok ili pravilno naklijavanje. Pravilno naklijavanje posle zalamanja vršne klice daje pozitivan uticaj na bolje zametanje krtola.

Rastojanje u sadnji

28/35 mm: 25 cm (54.000 biljaka/ha)

35/55 mm: 30 cm (45.000 biljaka/ha)

50/55 mm: 40 cm (33.000 biljaka/ha)

Korovi

Posle nicanja, standardno korišćenje metribuzina (Sencor) može dati reakciju na cimi, ali retko utiče na smanjenje prinosa.

Fungicidi

Savetuje se preventivno prskanje protiv plamenjače.

Vađenje

Zbog ocene osetljivosti na pojavu modrica na krtolama i/ili oštećenja tokom vađenja, sačekajte sa vađenjem najmanje tri nedelje nakon uništavanja cime.

Temperatura skladištenja - Vreme skladištenja

Poželjna temperatura skladištenja je 5 °C. Za potrebe prerade, ne skladištite ispod 7 °C. Pogodna za duže skladištenje.



Say potato,
say Agrico.

Otpornost

Virus uvijenosti lista: blago osetljiva / 6

Virus - Yn: blago do nije osetljiva / 8

Virus - Yntn (na krtolama): blago osetljiva / 7

Prskanje: blago osetljiva / 7

Plamenjača - cima: osetljiva / 5,5

Plamenjača - krtole: blago osetljiva / 7

Fusarium: blago osetljiva / 6,5

Obična krastavost: veoma osetljiva / 4,5

Prašna krastavost: veoma osetljiva / 3

Crne pege: - / -

Rak krompira F1: blago osetljiva / 9

Rak krompira F6: prilično osetljiva / 6

Rak krompira F18: - / -

Zlatne nematode Ro1/4: otporna / 9

Zlatne nematode Ro2/3: - / -

Bele nematode Pa 2: osetljiva / 2

Bele nematode Pa 3: osetljiva / 2