

Artemis.

Druga rana konzumna sorta sa odličnim prinosom i odlična za kućni pomfrit.



Maloprodaja
Svež



Tradicionalno

- ▶ **Odličan kvalitet za prženje**
- ▶ **Dobra tolerancija na modrice i povrede**
- ▶ **Višestruka otpornost**



Karakteristike

Opšte karakteristike

Selekcioner: Agrico Research B.V.
Ukrštanje: Rianta x Renska
Pravo oplemenjivača: 31-12-2029
Perspektivni klonovi: AR 87-0039

Karakteristike biljke i krtola

Stasavanje: drugi rani / 7
Svetla boja klice: zelena / G
Boja cveta: bela / W
Broj bobica: veoma visok / 4
Cima - početni razvoj: prilično brz / 7,5
Cima - završni razvoj: prosečan / 7
Cima - čvrstina: prosečna / 6
Boja pokožice: žuta / Y
Boja mesa: svetlo žuta / 6
Formiranost pokožice: dobra / 7
Oblik krtola: ovalno-izdužene / OL
Pravilnost oblika krtola: pravilan / 7
Tuberizacija: prilično velika / 7
Krupnoća krtola: prilično krupne / 7
Pravilnost krupnoće: pravilan / 7
Dormantnost: prilično kratka / 5,5

Osetljivost i kvalitet

Sekundarni rast: prilično osetljiva / 6,5
Unutrašnje modrice: blago do nije osetljiva / 8
Pucanje krtola: blago osetljiva / 7
Povrede kod vađenja: prilično osetljiva / 6,5
Metribuzin - pre nicanja: prilično osetljiva / 6
Metribuzin - posle nicanja: prilično osetljiva / 6
Bentazon: - / -
Etilen: - / -
Specifična težina u vodi: 375
Sadržaj suve materije: 20,4%
Tip raskuvavanja: prilično brašnava / B
Tamnjenje posle raskuvavanja: prilično osetljiva / 6
Promena boje pre kuvanja: - / -
Kvalitet za prženje: prosečna / 6
Distribucija suve materije: - / -
Kvalitet hrskavosti: prosečna / 6
TGA-nivo: 4,9

Kako gajiti

Đubrenje i tretman semena ¹

Azot: standardni savet +10 %.

Fosfor: standardni savet.

Kalijum: standardni savet.

Tretman semena

Poželjna je sadnja krtola u toplo zemljište, jer je inicijalni razvoj ove sorte spor. Pravilno naklijavanje posle zalamanja vršne klice daje pozitivan uticaj na bolje zemetanje krtola.

Rastojanje u sadnji

28/35 mm: 27 cm (50.000 biljaka/ha)

35/55 mm: 33 cm (40.000 biljaka/ha)

Korovi

Posle nicanja, standardno korišćenje metribuzina (Sencor) može dati reakciju na cimi i malo umanjeje prinosa.

Fungicidi

Neophodan je strogi preventivni raspored prskanja protiv plamenjače.

Vađenje

Zbog ocene osetljivosti na pojavu modrica na krtolama i/ili oštećenja tokom vađenja, sačekajte sa vađenjem najmanje dva nedelje nakon uništavanja cime.

Temperatura skladištenja - Vreme skladištenja

Poželjna temperatura skladištenja je 5 °C. Za potrebe prerade, ne skladištite ispod 7 °C. Pogodna za kraće skladištenje.



www.agricopotatoes.rs



Otpornost

Virus uvijenosti lista: blago osetljiva / 7

Virus - Yn: blago osetljiva / 6,5

Virus - Yntn (na krtolama): blago do nije osetljiva / 8

Prskanje: blago osetljiva / 6

Plamenjača - cima: osetljiva / 5

Plamenjača - krtole: blago do nije osetljiva / 8

Fusarium: osetljiva / 5

Obična krastavost: osetljiva / 5,5

Say potato,
say Agrico.

Prašna krastavost: osetljiva / 5,5

Crne pege: blago osetljiva / 7

Rak krompira F1: otporna / 10

Rak krompira F6: - / -

Rak krompira F18: - / -

Zlatne nematode Ro1/4: otporna / 9

Zlatne nematode Ro2/3: - / -

Bele nematode Pa 2: - / -

Bele nematode Pa 3: - / -