

Esmee.

Druga rana konzumna sorta sa lepom crvenom pokožicom, dobrom tolerantnošću na visoke temperature i dobrim prinosom.




Maloprodaja
Svež



Tradicionalno

- ▶ **Predivan izgled**
- ▶ **Krupne krtole**
- ▶ **Višestruka otpornost na viruse**



Karakteristike

Opšte karakteristike

Selekcioner: Agrico Research B.V.
Ukrštanje: LAURA x RODEO
Pravo oplemenjivača: 31-12-2043
Perspektivni klonovi: AR 01-0410

Karakteristike biljke i krtola

Stasavanje: drugi rani / 6,5
Svetla boja klice: crveno-ljubičasta / RV
Boja cveta: svetlo ljubičasta / LP
Broj bobica: veoma visok / 4
Cima - početni razvoj: prilično brz / 7
Cima - završni razvoj: prilično dobar / 7,5
Cima - čvrstina: prilično čvrsta / 7
Boja pokožice: crvena / R
Boja mesa: žuta / 7
Formiranost pokožice: odlična / 8
Oblik krtola: ovalno-izdužene / OL
Pravilnost oblika krtola: prilično pravilan / 6,5
Tuberizacija: srednja / 6
Krupnoća krtola: krupne / 8
Pravilnost krupnoće: pravilan / 7
Dormantnost: srednja / 6

Osetljivost i kvalitet

Sekundarni rast: prilično osetljiva / 6,5
Unutrašnje modrice: blago do nije osetljiva / 8
Pucanje krtola: prilično osetljiva / 6
Povrede kod vađenja: prilično osetljiva / 6,5
Metribuzin - pre nicanja: veoma osetljiva / 4
Metribuzin - posle nicanja: blago osetljiva / 7
Bentazon: blago osetljiva / 7
Etilen: 5% manje do 5% više krtola / 5
Specifična težina u vodi: 326
Sadržaj suve materije: 18%
Tip raskuvavanja: prilično čvrsta / AB
Tamnjenje posle raskuvavanja: osetljiva / 5,5
Promena boje pre kuvanja: prilično osetljiva / 6
Kvalitet za prženje: prosečna / 6
Distribucija suve materije: - / -
Kvalitet hrskavosti: nije pogodna / 4
TGA-nivo: 8,2

Preporuke za gajenje



www.agricopotatoes.rs

Đubrenje i tretman semena ¹

Azot: standardni savet +10 %.

Fosfor: standardni savet.

Kalijum: standardni savet.

Tretman semena

Može se saditi direktno po iznošenju iz hladnog skladišta, poželjno je posle izlaganja kratkom temperaturnom šoku. Zalamanje klice može imati negativan uticaj na prinos i ujednačenost krupnoće krtola.

Rastojanje u sadnji

28/35 mm: 25 cm (54.000 biljaka/ha)

35/55 mm: 30 cm (45.000 biljaka/ha)

Korovi

Posle nicanja, ne koristite metribuzin (Sencor), jer daje jaku reakciju na cimi i ozbiljno smanjenje prinosa.

Fungicidi

Neophodan je strogi preventivni raspored prskanja protiv plamenjače.

Vađenje

Zbog ocene osetljivosti na pojavu modrica na krtolama i/ili oštećenja tokom vađenja, sačekajte sa vađenjem najmanje tri nedelje nakon uništavanja cime.

Temperatura skladištenja - Vreme skladištenja

Poželjna temperatura skladištenja je 5 °C. Pogodna za kraće skladištenje.



Say potato,
say Agrico.

Otpornost

Virus uvijenosti lista: - / -

Virus - Yn: blago do nije osetljiva / 8

Virus - Yntn (na krtolama): blago osetljiva / 7

Prskanje: veoma osetljiva / 4

Plamenjača - cima: veoma osetljiva / 4,5

Plamenjača - krtole: blago osetljiva / 7

Fusarium: blago osetljiva / 7

Obična krastavost: blago osetljiva / 6

Prašna krastavost: blago osetljiva / 6,5

Crne pege: osetljiva / 5,5

Rak krompira F1: otporna / 10

Rak krompira F6: - / -

Rak krompira F18: - / -

Zlatne nematode Ro1/4: - / -

Zlatne nematode Ro2/3: - / -

Bele nematode Pa 2: - / -

Bele nematode Pa 3: - / -