


Evolution.



Tradicionalno

Druga rana konzumna sorta sa atraktivnom tamno crvenom bojom pokožice i ranim dobrim prinosom.

- » **Krupne krtole**
- » **Dobra tolerantnost na sušu**
- » **Dobra višestruka otpornost na ciste nematoda**



Karakteristike

Opšte karakteristike

Selekcioner: Agrico Research B.V.
 Ukrštanje: AR 94-0807 x AMOROSA
 Pravo oplemenjivača: 31-12-2042
 Perspektivni klonovi: AR 99-0522

Karakteristike biljke i krtola

Stasavanje: drugi rani / 6,5
 Svetla boja klice: zelena-crvena / GR
 Boja cveta: svetlo ljubičasta / LP
 Broj bobica: iznad proseka / 5
 Cima - početni razvoj: prilično brz / 7,5
 Cima - završni razvoj: dobar / 8
 Cima - čvrstina: prosečna / 6,5
 Boja pokožice: crvena / R
 Boja mesa: svetlo žuta / 6
 Formiranost pokožice: dobra / 7
 Oblik krtola: ovalno-izdužene / OL
 Pravilnost oblika krtola: prilično pravilan / 6
 Tuberizacija: prilično velika / 7
 Krupnoća krtola: krupne / 8
 Pravilnost krupnoće: prilično pravilan / 6,5
 Dormantnost: kratka / 4

Osetljivost i kvalitet

Sekundarni rast: prilično osetljiva / 6
 Unutrašnje modrice: blago osetljiva / 7
 Pucanje krtola: prilično osetljiva / 6
 Povrede kod vađenja: blago osetljiva / 7
 Metribuzin - pre nicanja: blago osetljiva / 7
 Metribuzin - posle nicanja: blago osetljiva / 7,5
 Bentazon: blago osetljiva / 7
 Etilen: 5% do 15% više krtola / 6
 Specifična težina u vodi: 343
 Sadržaj suve materije: 18,9%
 Tip raskuvavanja: prilično brašnava / B
 Tamnjenje posle raskuvavanja: prilično osetljiva / 6
 Promena boje pre kuvanja: - / -
 Kvalitet za prženje: nije pogodna / 4,5
 Distribucija suve materije: - / -
 Kvalitet hrskavosti: nije pogodna / 4
 TGA-nivo: 8

Preporuke za gajenje



www.agricopotatoes.rs

Đubrenje i tretman semena ¹

Azot: standardni savet -10 %.

Fosfor: standardni savet.

Kalijum: standardni savet.

Tretman semena

Može se saditi direktno po iznošenju iz hladnog skladišta, poželjno je posle izlaganja kratkom temperaturnom šoku. Zalamanje klice više od jedan put imaće negativan uticaj na prinos i ujednačenost krupnoće krtola.

Rastojanje u sadnji

28/35 mm: 25 cm (54.000 biljaka/ha)

35/55 mm: 30 cm (45.000 biljaka/ha)

Korovi

Posle nicanja, standardno korišćenje metribuzina (Sencor) može dati reakciju na cimi, ali retko utiče na smanjenje prinosa.

Fungicidi

Neophodan je strogi preventivni raspored prskanja protiv plamenjače.

Vađenje

Zbog ocene osetljivosti na pojavu modrica na krtolama i/ili oštećenja tokom vađenja, sačekajte sa vađenjem najmanje dva nedelje nakon uništavanja cime.

Temperatura skladištenja - Vreme skladištenja

Poželjna temperatura skladištenja je 5 °C. Pogodna za isporuku direktno sa njive ili posle kraćeg skladištenja.



Say potato,
say Agrico.

Otpornost

Virus uvijenosti lista: - / -

Virus - Yn: osetljiva / 5,5

Virus - Yntn (na krtolama): blago osetljiva / 7

Prskanje: osetljiva / 5

Plamenjača - cima: veoma osetljiva / 4

Plamenjača - krtole: blago osetljiva / 6

Fusarium: blago osetljiva / 6

Obična krastavost: blago osetljiva / 6

Prašna krastavost: blago osetljiva / 6,5

Crne pege: blago osetljiva / 6

Rak krompira F1: srednje osetljiva / 8

Rak krompira F6: otporna / 10

Rak krompira F18: - / -

Zlatne nematode Ro1/4: otporna / 9

Zlatne nematode Ro2/3: srednje osetljiva / 6

Bele nematode Pa 2: otpornost u polju / 7

Bele nematode Pa 3: srednje osetljiva / 5