
PREPORUKA ZA GAJENJE

Evolution.

Druga rana konzumna sorta sa atraktivnomtamno crvenom bojom pokožice i ranim dobrim prinosom.

- **Krupne krtole**
- **Dobra tolerantnost na sušu**
- **Dobra višestruka otpornost na ciste nematoda**

Tradicionalno



Karakteristike

Opšte karakteristike

Selekcioner: Agrico Research B.V.
Ukrštanje: AR 94-0807 x AMOROSA
Pravo oplemenjivača: 31-12-2042
Perspekrtivni klonovi: AR 99-0522

Karakteristike biljke i krtola

Stasavanje: drugi rani / 6,5
Svetla boja klice: zelena-crvena / GR
Boja cveta: svetlo ljubičasta / LP
Broj bobica: iznad proseka / 5
Cima - početni razvoj: prilično brz / 7,5
Cima - završni razvoj: dobar / 8
Cima - čvrstina: prosečna / 6,5
Boja pokožice: crvena / R
Boja mesa: svetlo žuta / 6
Formiranost pokožice: dobra / 7
Oblik krtola: ovalno-izdužene / OL
Pravilnost oblika krtola: prilično pravilan / 6
Tuberizacija: prilično velika / 7
Krupnoća krtola: krupne / 8
Pravilnost krupnoće: prilično pravilan / 6,5
Dormantnost: kratka / 4

Osetljivost i kvalitet

Sekundarni rast: prilično osetljiva / 6
Unutrašnje modrice: blago osetljiva / 7
Pucanje krtola: prilično osetljiva / 6
Povrede kod vađenja: blago osetljiva / 7
Metribuzin - pre nicanja: blago osetljiva / 7
Metribuzin - posle nicanja: blago osetljiva / 7,5
Bentazon: blago osetljiva / 7
Etilen: 5% do 15% više krtola / 6
Specifična težina u vodi: 343
Sadržaj suve materije: 18,9%
Tip raskuvavanja: prilično brašnava / B
Tamnjenje posle raskuvavanja: prilično osetljiva / 6
Promena boje pre kuvanja: - / -
Kvalitet za prženje: nije pogodna / 4,5
Distribucija suve materije: - / -
Kvalitet hrskavosti: nije pogodna / 4
TGA-nivo: 8

Agrico je uložio zavidan napor da bi se dobio što precizniji opis ove sorte. Međutim, imajte na umu da sve informacije mogu biti podložne promeni i Agrico ne prihvata odgovornost za greške ili propuste. Agrico ni u kom slučaju neće biti odgovoran za štetu koja nastane kod nas ili u vezi sa informacijama sadržanim u ovom opisu.

PREPORUKA ZA GAJENJE

Preporuke za gajenje

www.agricopotatoes.rs

Đubrenje i tretman semena [1]

Azot: standardni savet -10 %.
Fosfor: standardni savet.
Kalijum: standardni savet.

Tretman semena

Može se saditi direktno po iznošenju iz hladnog skladišta, poželjno je posle izlaganja kratkom temperaturnom šoku.Zalamanje klice više od jedan put imaće negativan uticaj na prinos i ujednačenost krupnoće krtola.

Rastojanje u sadnji

28/35 mm: 25 cm (54.000 biljaka/ha)
35/55 mm: 30 cm (45.000 biljaka/ha)

Korovi

Posle nicanja, standardno korišćenje metribuzina (Sencor) može dati reakciju na cimi, ali retko utiče na smanjenje prinosa.

Fungicidi

Neophodan je strogi preventivni raspored prskanja protiv plamenjače.

Vađenje

Zbog ocene osetljivosti na pojavu modrica na krtolama i/ili oštećenja tokom vađenja, sačekajte sa vađenjem najmanje dva nedelje nakon uništavanja cime.

Temperatura skladištenja - Vreme skladištenja

Poželjna temperatura skladištenja je 5 °C. Pogodna za isporuku direktno sa njive ili posle kraćeg skladištenja.



Say potato, say Agrico.

Otpornost

Virus uvijenosti lista: - / -
Virus - Yn: osetljiva / 5,5
Virus - Yntn (na krtolama): blago osetljiva / 7
Prskanje: osetljiva / 5
Plamenjača - cima: veoma osetljiva / 4
Plamenjača - krtole: blago osetljiva / 6
Fusarium: blago osetljiva / 6
Obična krastavost: blago osetljiva / 6
Prašna krastavost: blago osetljiva / 6,5
Crne pege: blago osetljiva / 6
Rak krompira F1: srednje osetljiva / 8
Rak krompira F6: otporna / 10
Rak krompira F18: - / -
Zlatne nematode Ro1/4: otporna / 9
Zlatne nematode Ro2/3: srednje osetljiva / 6
Bele nematode Pa 2: otpornost u polju / 7
Bele nematode Pa 3: srednje osetljiva / 5

AGRICO
Arum Deč. • Borhesova 31 • 11080 Beograd • Zemun Srbija (+381) 11 3774 706
info@arum.rs www.agricopotatoes.rs
ARUM DEČ