

Kuroda.



Tradicionalno

Rani glavni usev, konzumna sorta sa crvenom pokožicom, odlična tolerancija na visoke temperature i veoma dobar prinos.

- ▶ **Krupne krtole**
- ▶ **Dobro skladištenje**
- ▶ **Višestruka otpornost na rak krompira**



Karakteristike

Opšte karakteristike

Selekcioner: G. Kuik

Ukrštanje: AR 76-199-03 x KO 80-1407

Pravo oplemenjivača: 31-12-2025

Perspektivni klonovi: KK 83-0216

Karakteristike biljke i krtola

Stasavanje: rani glavni usev / 6

Svetla boja klice: plavo-ljubičasta / BV

Boja cveta: ljubičasta / P

Broj bobica: prosečno / 6

Cima - početni razvoj: prilično brz / 7

Cima - završni razvoj: dobar / 8

Cima - čvrstina: prilično čvrsta / 7,5

Boja pokožice: crvena / R

Boja mesa: svetlo žuta / 6

Formiranost pokožice: dobra / 7

Oblik krtola: ovalne / O

Pravilnost oblika krtola: prilično pravilan / 6,5

Tuberizacija: prilično malo / 5

Krupnoća krtola: krupne / 8

Pravilnost krupnoće: pravilan / 7

Dormantnost: duga / 8

Osetljivost i kvalitet

Sekundarni rast: blago osetljiva / 7

Unutrašnje modrice: prilično osetljiva / 6

Pucanje krtola: blago osetljiva / 7

Povrede kod vađenja: osetljiva / 5

Metribuzin - pre nicanja: osetljiva / 5

Metribuzin - posle nicanja: osetljiva / 5

Bentazon: - / -

Etilen: 15% do 25% više krtola / 7

Specifična težina u vodi: 426

Sadržaj suve materije: 23%

Tip raskuvavanja: brašnava / BC

Tamnjenje posle raskuvavanja: veoma osetljiva / 4,5

Promena boje pre kuvanja: - / -

Kvalitet za prženje: ispod proseka / 5,5

Distribucija suve materije: - / -

Kvalitet hrskavosti: nije pogodna / 5

TGA-nivo: -



Preporuke za gajenje

www.agricopotatoes.rs

Đubrenje i tretman semena ¹

Azot: standardni savet +10 %.

Fosfor: standardni savet.

Kalijum: standardni savet +20 %.

Tretman semena

Pravilno naklijavanje posle zalamanja vršne klice daje pozitivan uticaj na bolje zemetanje krtola. Jedno zalamanje klice je opcija.

Rastojanje u sadnji

28/35 mm: 22 cm (60.500 biljaka/ha)

35/55 mm: 27 cm (50.000 biljaka/ha)

Korovi

Posle nicanja, ne koristite metribuzin (Sencor), jer daje jaku reakciju na cimi i ozbiljno smanjenje prinosa.

Fungicidi

Neophodan je strogi preventivni raspored prskanja protiv plamenjače.

Vađenje

Zbog ocene osetljivosti na pojavu modrica na krtolama i/ili oštećenja tokom vađenja, sačekajte sa vađenjem najmanje tri nedelje nakon uništavanja cime.

Temperatura skladištenja - Vreme skladištenja

Poželjna temperatura skladištenja je 5 °C. Pogodna za duže skladištenje.



Say potato,
say Agrico.

Otpornost

Virus uvijenosti lista: blago osetljiva / 6

Virus - Yn: blago osetljiva / 7

Virus - Yntn (na krtolama): blago osetljiva / 7

Prskanje: blago osetljiva / 7

Plamenjača - cima: osetljiva / 5

Plamenjača - krtole: osetljiva / 5

Fusarium: blago do nije osetljiva / 8

Obična krastavost: osetljiva / 5

Prašna krastavost: veoma osetljiva / 2

Crne pege: - / -

Rak krompira F1: otporna / 10

Rak krompira F6: blago osetljiva / 9

Rak krompira F18: - / -

Zlatne nematode Ro1/4: otporna / 9

Zlatne nematode Ro2/3: - / -

Bele nematode Pa 2: - / -

Bele nematode Pa 3: - / -