

Levante.

Srednje stasna sorta, visoko prinostna sorta, sa lepom žutom bojom pokožice. Otporna na plamenjaču lista i krtola.



Organska



Maloprodaja
Svež



Tradicionalno

- » Zameće veliki broj krtola
- » Dobra pokožica
- » Dobro skladištenje



Karakteristike

Opšte karakteristike

Selekcioner: Agrico Research B.V.
Ukrštanje: AR 01-3218 x ALMERA
Pravo oplemenjivača: 31-12-2048
Perspektivni klonovi: AR 07-3009

Karakteristike biljke i krtola

Stasavanje: rani glavni usev / 5,5
Svetla boja klice: zelena-crvena / GR
Boja cveta: bela / W
Broj bobica: iznad proseka / 5,5
Cima - početni razvoj: prilično brz / 7
Cima - završni razvoj: dobar / 8
Cima - čvrstina: prilično čvrsta / 7
Boja pokožice: žuta / Y
Boja mesa: svetlo žuta / 6
Formiranost pokožice: dobra / 7
Oblik krtola: izduženo-ovalne / LO
Pravilnost oblika krtola: prilično pravilan / 6,5
Tuberizacija: velika / 8
Krupnoća krtola: prilično krupne / 7
Pravilnost krupnoće: pravilan / 7
Dormantnost: srednja / 6,5

Osetljivost i kvalitet

Sekundarni rast: blago osetljiva / 7
Unutrašnje modrice: prilično osetljiva / 6,5
Pucanje krtola: blago osetljiva / 7
Povrede kod vađenja: prilično osetljiva / 6
Metribuzin - pre nicanja: prilično osetljiva / 6,5
Metribuzin - posle nicanja: osetljiva / 5,5
Bentazon: blago osetljiva / 7
Etilen: 5% manje krtola / 4
Specifična težina u vodi: 365
Sadržaj suve materije: 19,9%
Tip raskuvavanja: prilično brašnava / B
Tamnjenje posle raskuvavanja: blago osetljiva / 7
Promena boje pre kuvanja: osetljiva / 5,5
Kvalitet za prženje: ispod proseka / 5,5
Distribucija suve materije: - / -
Kvalitet hrskavosti: nije pogodna / 4,5
TGA-nivo: 4,73



Preporuke za gajenje

www.agricopotatoes.rs

Đubrenje i tretman semena ¹

Azot: standardni savet. Poželjna je split aplikacija, drugu prihranu uraditi ubrzo posle zamatiranja krtola.

Fosfor: standardni savet.

Kalijum: standardni savet.

Tretman semena

Poželjna je sadnja krtola u toplo zemljište, jer je inicijalni razvoj ove sorte spor. Zalamanje klice može imati negativan uticaj na prinos i ujednačenost krupnoće krtola. Preporučuje se kratak temperaturni šok ili pravilno naklijavanje.

Rastojanje u sadnji

28/35 mm: 25 cm (60.500 plants/ha)

35/55 mm: 30 cm (49.500 plants/ha)

Korovi

Posle nicanja, standardno korišćenje metribuzina (Sencor) ne daje reakciju na cimi ili smanjenju prinosa.

Fungicidi

Uprkos otpornosti na plamenjaču, budite oprezni za infekcije.

Vađenje

Zbog ocene osetljivosti na pojavu modrica na krtolama i/ili oštećenja tokom vađenja, sačekajte sa vađenjem najmanje tri nedelje nakon uništavanja cime.

Temperatura skladištenja - Vreme skladištenja

Poželjna temperatura skladištenja je 4 °C Pogodna za srednji do dug period skladištenja.



Say potato,
say Agrico.

Otpornost

Virus uvijenosti lista: - / -

Virus - Yn: blago osetljiva / 6

Virus - Yntn (na krtolama): blago do nije osetljiva / 8,5

Prskanje: veoma osetljiva / 4,5

Plamenjača - cima: blago do nije osetljiva / 8,5

Plamenjača - krtole: blago osetljiva / 7,5

Fusarium: blago osetljiva / 6

Obična krastavost: osetljiva / 5

Prašna krastavost: blago osetljiva / 6,5

Crne pege: blago osetljiva / 7,5

Rak krompira F1: - / -

Rak krompira F6: - / -

Rak krompira F18: - / -

Zlatne nematode Ro1/4: otporna / 9

Zlatne nematode Ro2/3: - / -

Bele nematode Pa 2: - / -

Bele nematode Pa 3: - / -