PREPORUKA ZA GAJENJE

Lugano.

Srednje stasna sorta, žute boje mesa, za preradu, sa dobrom otpornošću na nematode.

- **Daje krupne krtole**
- **Višestruka otpornost**
- **Dobro skladištenje**

Prerada
Pomfrit

Tradicionalno



Karakteristike

Opšte karakteristike

Selekcioner: F.J. Vos
Ukrštanje: AR 00-2211 x AR 99-0669
Pravo oplemenjivača: 31-12-2048
Perspekrtivni klonovi: VO 07-0289

Karakteristike biljke i krtola

Stasavanje: rani glavni usev / 5,5
Svetla boja klice: crvena / R
Boja cveta: bela / W
Broj bobica: ispod proseka / 7
Cima - početni razvoj: prilično brz / 7
Cima - završni razvoj: dobar / 8
Cima - čvrstina: prilično čvrsta / 7,5
Boja pokožice: žuta / Y
Boja mesa: svetlo žuta / 6,5
Formiranost pokožice: prosečna / 6
Oblik krtola: ovalno-izdužene / OL
Pravilnost oblika krtola: prilično pravilan / 6
Tuberizacija: prilično malo / 5
Krupnoća krtola: krupne / 8
Pravilnost krupnoće: pravilan / 7
Dormantnost: duga / 8

Osetljivost i kvalitet

Sekundarni rast: prilično osetljiva / 6
Unutrašnje modrice: prilično osetljiva / 6
Pucanje krtola: prilično osetljiva / 6,5
Povrede kod vađenja: veoma osetljiva / 4,5
Metribuzin - pre nicanja: blago do nije osetljiva / 8
Metribuzin - posle nicanja: blago osetljiva / 7,5
Bentazon: blago do nije osetljiva / 8
Etilen: 5% do 15% više krtola / 6
Specifična težina u vodi: 394
Sadržaj suve materije: 21,4%
Tip raskuvavanja: prilično brašnava / B
Tamnjenje posle raskuvavanja: prilično osetljiva / 6,5
Promena boje pre kuvanja: prilično osetljiva / 6
Kvalitet za prženje: dobra / 7
Distribucija suve materije: dobar / 7,5
Kvalitet hrskavosti: ispod proseka / 5,5
TGA-nivo: 6,4

Agrico je uložio zavidan napor da bi se dobio što precizniji opis ove sorte. Međutim, imajte na umu da sve informacije mogu biti podložne promeni i Agrico ne prihvata odgovornost za greške ili propuste. Agrico ni u kom slučaju neće biti odgovoran za štetu koja nastane kod nas ili u vezi sa informacijama sadržanim u ovom opisu.

PREPORUKA ZA GAJENJE

Preporuke za gajenje

www.agricopotatoes.rs

Đubrenje i tretman semena [1]

Azot: standardni savet.

Fosfor: standardni savet.

Kalijum: standardni savet +20 %.

Tretman semena

Može se saditi direktno po iznošenju iz hladnog skladišta, poželjno je posle izlaganja kratkom temperaturnom šoku.Zalamanje klice više od dva puta imaće negativan uticaj na prinos i ujednačenost krupnoće krtola.

Rastojanje u sadnji

28/35 mm: 21-24 cm (60.000 plants/ha)

35/55 mm: 29-32 cm (45.000 plants/ha)

50/55 mm: 35-37 cm (37.000 plants/ha)

Korovi

Posle nicanja, standardno korišćenje metribuzina (Sencor) ne daje reakciju na cimi ili smanjenju prinosa.

Fungicidi

Savetuje se preventivno prskanje protiv plamenjače.

Vađenje

Zbog ocene osetljivosti na pojavu modrica na krtolama i/ili oštećenja tokom vađenja, sačekajte sa vađenjem najmanje tri nedelje nakon uništavanja cime.

Temperatura skladištenja - Vreme skladištenja

Poželjna temperatura skladištenja je 5 °C. Za potrebe prerade, ne skladištite ispod 7 °C. Pogodna za duže skladištenje.



Say potato, say Agrico.

Otpornost

Virus uvijenosti lista: - / -

Virus - Yn: osetljiva / 5,5

Virus - Yntn (na krtolama): blago osetljiva / 7,5

Prskanje: osetljiva / 5,5

Plamenjača - cima: osetljiva / 5

Plamenjača - krtole: osetljiva / 5,5

Fusarium: blago osetljiva / 6,5

Obična krastavost: osetljiva / 5,5

Prašna krastavost: blago osetljiva / 7,5

Crne pege: blago osetljiva / 6

Rak krompira F1: otporna / 10

Rak krompira F6: blago osetljiva / 9

Rak krompira F18: - / -

Zlatne nematode Ro1/4: otporna / 9

Zlatne nematode Ro2/3: otporna / 9

R_Golden nematode Ro 5: otporna / 9

Bele nematode Pa 2: otporna / 9

Bele nematode Pa 3: otporna / 9

AGRICO

Arum Deč. • Borhesova 31 • 11080 Beograd • Zemun Srbija (+381) 11 3774 706

info@arum.rs www.agricopotatoes.rs

ARUM DEČ